

## Vaccinazione contro i rotavirus nei neonati: raccomandazione complementare

Il rotavirus può causare diarrea grave. La malattia richiede talvolta il ricovero in ospedale o addirittura in cure intensive. Colpisce in particolare i neonati e i bambini piccoli fino ai 5 anni. In Svizzera, grazie al rapido accesso alle cure e alla qualità del trattamento fornito, i decessi legati al rotavirus sono estremamente rari. La vaccinazione dei neonati offre loro una protezione individuale ed evita i rischi associati alla malattia e all'eventuale ricovero in ospedale.

## Ogni anno in Svizzera circa mille bambini vengono ricoverati in ospedale a causa di un'infezione da rotavirus

Più di un terzo di tutti i ricoveri ospedalieri di bambini piccoli per gastroenterite è dovuto ai rotavirus. Tra il 2015 e il 2019, circa mille bambini sotto i 5 anni hanno dovuto essere ricoverati ogni anno a causa di una malattia da rotavirus. La stragrande maggioranza di questi neonati e bambini piccoli era precedentemente sana.

## Ogni neonato può trarre beneficio dalla vaccinazione

Praticamente tutti i bambini contraggono almeno un'infezione da rotavirus prima dei 3 anni. Le gastroenteriti gravi da rotavirus si verificano soprattutto tra i 6 mesi e i 2 anni. Le reinfezioni da rotavirus sono di solito più lievi e generalmente causano pochi sintomi in età adulta. Il vaccino è quindi particolarmente utile per i neonati, proteggendoli nei primi anni di vita.

## Il vaccino è sicuro e fornisce una protezione efficace contro le forme gravi della malattia

Rotarix® è l'unico vaccino omologato e disponibile in Svizzera contro le malattie da rotavirus. È un vaccino contenente virus vivi attenuati, che protegge dalla maggior parte dei ceppi selvatici. Gli studi dimostrano che fornisce una protezione fino al 96 per cento contro le forme gravi e i ricoveri ospedalieri associati ai rotavirus. Si presenta sotto forma di sospensione acquosa con saccarosio come altro componente. Non contiene alluminio.

Il vaccino è generalmente ben tollerato. Può verificarsi una diarrea transitoria. Secondo alcuni studi, il neonato può essere più irritabile per un breve periodo dopo la vaccinazione. Occasionalmente, possono comparire sintomi come febbre, flatulenza, dolore addominale o eruzione cutanea. Questi sintomi di solito si risolvono rapidamente.

Il vaccino è sicuro. Numerosi studi condotti dalla sua omologazione nel 2007 non hanno evidenziato effetti collaterali gravi. Era stato sospettato un aumento del rischio di invaginazione intestinale (scivolamento di una porzione dell'intestino in quella adiacente) nei bambini vaccinati – rispetto ai bambini non vaccinati – con un precedente vaccino contro i rotavirus. Tale rischio di invaginazione non è stato osservato con il vaccino attuale. Il medico valuterà se esiste una delle rare controindicazioni al vaccino.

## Un vaccino orale somministrato in occasione delle prime visite di routine

Il vaccino viene somministrato per via orale a 2 e 4 mesi di età, quindi non sono necessarie iniezioni. La vaccinazione contro il rotavirus non richiede un'ulteriore visita medica poiché il vaccino può essere somministrato contemporaneamente ai vaccini di base previsti per la stessa fascia di età. La prima dose può essere somministrata al più presto a 6 settimane di età. L'intervallo tra le dosi deve essere di almeno 4 settimane. La seconda dose di vaccino deve essere somministrata prima delle 24 settimane di età.

## La vaccinazione contro i rotavirus è coperta dall'assicurazione di base

L'utilità di questa vaccinazione è stata dimostrata. Dal 1° gennaio 2024, il suo costo è coperto dall'assicurazione malattie obbligatoria, previa deduzione della franchigia e dell'aliquota percentuale.

## Il medico raccomanda la vaccinazione contro i rotavirus per il benessere del vostro bambino

La vaccinazione è raccomandata a tutti i bambini che i genitori desiderano proteggere dall'infezione da rotavirus. Il rischio di contrarre una gastroenterite da rotavirus è quasi del 100 per cento nei primi tre anni di vita. Il rischio di un decorso grave dell'infezione può essere notevolmente ridotto da una vaccinazione efficace e sicura. Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi al proprio medico.

**Questo documento è stato redatto dalla Commissione federale per le vaccinazioni**

Stato: marzo 2024

Timbro del medico

Copie supplementari possono essere ordinate a:  
UFCL, Distribuzione pubblicazioni, Berna  
[www.pubblicazionifederali.admin.ch](http://www.pubblicazionifederali.admin.ch)

**N. d'ordinazione: 316.536.i**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

***EKIF : CFV***

**COMMISSIONE FEDERALE PER LE VACCINAZIONI**

Segretariato: Sezione Vaccinazione,  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Tel. segretariato: +41 (0)58 463 87 06, fax segretariato: +41 (0)58 463 87 95  
E-mail: [cfv@bag.admin.ch](mailto:cfv@bag.admin.ch), Internet: [www.cfv.ch](http://www.cfv.ch)