

DUO-KAR® 20 EW

NOVITÀ!

| | |
|------------------|----------------------------|
| Composizione | Miclobutanil 20% (200 g/L) |
| Formulazione | Emulsione olio/acqua |
| Gruppo | FRAC 3 |
| N. registrazione | 15894 del 08-01-2014 |
| Confezione | in definizione |

Fungicida sistemico in emulsione olio/acqua per il controllo dell'oidio su numerose colture

CARATTERISTICHE

DUO-KAR 20 EW è un fungicida sistemico per lo specifico controllo di oidio su viti e su numerose altre colture arboree, orticole e floreali, ticchiolatura del melo, del pero e della rosa, monilia del pesco e del susino e ruggine del garofano.

| COLTURA | AVVERSITÀ | INDICAZIONI DI IMPIEGO | INT. SIC. GIORNI |
|---|---|---|------------------|
| VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA | Oidio (<i>Uncinula necator</i>) | 22,5-30 ml/hl da quando i germogli sono ben formati fino all'allegagione ad intervalli di 10-12 giorni | 15 gg |
| | Marciume nero | 30-35 ml/hl da allegagione ad intervalli di 8-12 giorni in funzione della pressione della malattia e della sensibilità varietale | |
| MELO, PERO | Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 27,5-35 ml/hl dalla comparsa delle orecchiette di topo ad intervalli di 8-12 giorni in funzione della fase vegetativa e dell'intensità della malattia | 15 gg |
| PESCO, NETTARINE, SUSINO E ALBICOCCO | Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Podosphaera tridactyla</i>) | 27,5-35 ml/hl dalla sfioritura ripetere i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni | 7 gg |
| | Monilia del fiore | 27,5-35 ml/hl 2 trattamenti a bottoni rosa ed a caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia effettuare un ulteriore trattamento in fioritura | |
| | Monilia del frutto | 27,5-35 ml/hl in pre-raccolta effettuare 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni | |
| MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, CETRIOLO, ZUCCA | Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) | 27,5-35 ml/hl trattamenti preventivi oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-12 giorni | 3 gg |

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



| COLTURA | AVVERSITÀ | INDICAZIONI DI IMPIEGO | INT. SIC. GIORNI |
|-------------------------------------|---|---|------------------|
| POMODORO, PEPERONE E CARCIOFO | Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) | 27,5-35 ml/hl trattamenti preventivi oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-12 giorni | 3 gg |
| FRAGOLA | Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i>) | 22,5-30 ml/hl iniziare i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni | 3 gg |
| ROSA E GAROFANO | Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa var. rosae</i>) <i>Ticchiolatura della rosa</i> <i>Ruggine del garofano</i> | 22,5-30 ml/hl alla prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-12 giorni. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione della malattia | - |