

VITE



LIETO SC

GUARDA LA PERONOSPORA CON OCCHI DIVERSI


**Il nuovo antiperonosporico che protegge il grappolo**

- Protezione affidabile e costante anche in condizioni climatiche difficili
- Elevata attività collaterale su botrite
- Soluzione unica e ottimizzata per le strategie antiresistenza
- Formulato esclusivo sviluppato per i programmi di difesa integrata

LIETO SC È IL NUOVO FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI PERONOSPORA E ALTERNARIA SU VITE, POMODORO, PATATA E TABACCO

## DUE PRINCIPI ATTIVI UNICI

per meccanismo di azione e complementari per attività sulla coltura da proteggere.



## MISCELA OTTIMIZZATA E DOSI CORRETTE

per garantire la protezione completa in tutte le condizioni.


4,5 L/ha

132,3 g Cimoxanil  
169,2 g Zoxamide



4 L/ha

117,6 g Cimoxanil  
150,4 g Zoxamide



## FORMULAZIONE SC ECOSOSTENIBILE

a base di glicerina vegetale che esalta l'adesione della Zoxamide e la penetrazione di Cimoxanil nei tessuti vegetali.



## POSIZIONAMENTO TECNICO DI LIETO SC SU VITE

LIETO SC trova la massima efficacia dalla fioritura in poi a protezione del grappolo.


STADI FENOLOGICI								
								
Germogliamento	Grappoli separati	Inizio fioritura	Fine fioritura	Allegagione	Pre-chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Invaiaatura	Pre-raccolta

**Lieto SC**

## LIETO SC SU VITE

<b>Colture</b>	Vite da vino Vite da tavola
<b>Avversità</b>	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ) Botrite ( <i>Botrytis cinerea</i> ) azione collaterale
<b>Dose d'impiego</b>	450 ml/hl (4-4,5 L/ha)
<b>Numero massimo di trattamenti</b>	4
<b>Intervallo di sicurezza</b>	28 giorni
<b>Limite max di residuo ammesso (LMR)</b>	Uve da vino e da tavola: 0,3 ppm Cimoxanil - 5 ppm Zoxamide
<b>Intervallo tra i trattamenti</b>	7-10 giorni



COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE D'IMPIEGO	INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI	INTERVALLO DI SICUREZZA (GIORNI)
Vite da vino e da tavola 	Peronospora Botrite attività collaterale	450 ml/hl (4-4,5 L/ha)	7 -10 giorni  Max. 4 interventi per ciclo colturale. Al fine di allungare i tempi di intervento e per un'ottimale attività sulla vegetazione in attiva crescita si consiglia di utilizzarlo in miscela con ELIOS WG TOP	28
Pomodoro in campo	Peronospora Alternaria Botrite attività collaterale	450 ml/hl (4-4,5 L/ha)	7 -10 giorni  Max. 4 interventi per ciclo colturale	3
Patata	Peronospora Alternaria	450 ml/hl (4-4,5 L/ha)	7 -10 giorni  Max. 4 interventi per ciclo colturale	7
Tabacco	Peronospora	400-450 ml/hl (4-4,5 L/ha)	7 -10 giorni  Max. 3 interventi per ciclo colturale	14

## LIETO SC in sintesi



### Composizione

CIMOCHANIL 2,5% (=29,4 g/L) - ZOXAMIDE 3,2% (=37,6 g/L)

### Formulazione

SOSPENSIONE CONCENTRATA

### Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

### Registrazione n.

N. 16355 DEL 18/04/2017

### Gamma confezioni

1 L, 5 L, 10 L