

LIETO® SC

Composizione	Cimoxanil 2,5% (29,4 g/L) Zoxamide 3,2% (37,6 g/L)
Formulazione	Sospensione concentrata
Gruppo	FRAC 27, 22
N. registrazione	16335 del 18-04-2017
Confezione	1 L (x 10), 10 L

NOVITÀ!



Fungicida citotropico e di contatto per il controllo della peronospora su vite e tabacco e della peronospora e alternaria su pomodoro e patata

CARATTERISTICHE

LIETO SC è il nuovo fungicida antiperonosporico a base di cimoxanil (ad azione citotropica e translaminare) e zoxamide (che agisce per contatto). LIETO SC copre tenacemente le superfici vegetali e penetra rapidamente nei tessuti, resistendo al dilavamento. Su vite LIETO SC è particolarmente indicato per la protezione del grappolo dalla peronospora, fornendo nel contempo un'attività collaterale antibiottrica. Su tabacco LIETO SC è efficace su peronospora, su pomodoro e patata su peronospora e alternaria, con effetto collaterale sulla botrite del pomodoro.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE	<i>Plasmopara viticola</i>	450 ml/hl (4-4,5 l/ha) intervento preventivo ad intervalli di 7-10 giorni	28 gg
POMODORO	<i>Phytophthora infestans</i> e <i>Alternaria solani</i>	450 ml/hl (4-4,5 l/ha) intervento preventivo ad intervalli di 7-10 giorni	3 gg
PATATA	<i>Phytophthora infestans</i> e <i>Alternaria solani</i>	450 ml/hl (4-4,5 l/ha) intervento preventivo ad intervalli di 7-10 giorni	7 gg
TABACCO	<i>Phytophthora infestans</i>	400-450 ml/hl (4-4,5 l/ha) intervento preventivo ad intervalli di 7-10 giorni	14 gg



Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.