

MACHO®



Composizione	Quinoxifen 3,6% (48 g/L) Zolfo 47% (630 g/L)
Formulazione	Sospensione concentrata
Gruppo	FRAC I3, M2
N. registrazione	I3055 del 22-10-2010
Confezione	1 L (x 10), 5 L (x 4)

Fungicida ad azione preventiva per il controllo dell'oidio su vite, fruttiferi, cucurbitacee e altre colture

CARATTERISTICHE

MACHO è un antioidico specifico a base di quinoxifen e zolfo, dotato di attività preventiva e lunga persistenza di azione. È in grado di fissarsi e ridistribuirsi sulle cere epicuticolari di grappoli, frutti, tralci o giovani rametti e foglie.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE (da vino e da tavola)	Oidio	1-1,3 l/ha (100-130 ml/hl) interventi preventivi fino all'inizio della fioritura con intervalli di 8-12 giorni 1,3-1,6 l/ha (130-160 ml/hl) da impiegare successivamente a intervalli di 8-10 giorni. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia	28 gg
PESCO, ALBICOCCO	Oidio	1,3-1,6 l/ha (100-120 ml/hl) interventi preventivi da sfioritura ad intervalli di 8-12 giorni. Massimo 2 trattamenti per anno. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggiore incidenza della malattia	14 gg
MELO	Oidio	1,3-1,6 l/ha (100-120 ml/hl) interventi preventivi ad intervalli di 10-14 giorni. In presenza di sintomi di infezioni primarie alla ripresa vegetativa effettuare trattamenti con fungicidi ad azione curativa e/o endoterapica. Eseguire al massimo 2 trattamenti per anno	14 gg



Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
MELONE, ZUCCHINO, ANGURIA (in pieno campo)	Oidio	1-1,3 l/ha (100-130 ml/hl) interventi preventivi oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-12 giorni. Eseguire al massimo 3 trattamenti per anno	7 gg Anguria, Melone 3 gg Zucchino
CARCIOFO (in pieno campo)	Oidio	1-1,5 l/ha (100-150 ml/hl) interventi preventivi oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Eseguire al massimo 3 trattamenti per anno	3 gg
FRAGOLA (in pieno campo e in serra)	Oidio	1-1,5 l/ha (100-150 ml/hl). interventi preventivi oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Eseguire al massimo 3 trattamenti per anno	3 gg