



## CABRIO® TOP

FUNGICIDA POLIVALENTE AUTORIZZATO SU POMODORO E VITE

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono 5 g di **F500®** (**Pyraclostrobin**) e 55 g di **Metiram**

### FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)

### CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE

### REG. MIN. SALUTE

N° 12528  
del 02-02-2005

### CONFEZIONE

Flacone da 1 kg  
Sacchetto da 5 kg

### IMBALLO

Cartone  
- da 10 flaconi  
- da 2 sacchetti

### CARATTERISTICHE

È un fungicida ad ampio spettro d'azione per **Pomodoro** e **Vite**.

**CABRIO® TOP** nasce dalla combinazione di due sostanze attive che agiscono con modalità complementari su un ampio spettro di malattie. **CABRIO® TOP** in parte penetra rapidamente nei tessuti della pianta ed in parte aderisce tenacemente alle superfici. Inoltre, non essendo dotato di attività sistemica, non incorre in diluizioni a carico degli organi più importanti (es. grappoli). Di conseguenza, **CABRIO® TOP** offre una protezione continua e duratura delle parti trattate, limitando il rischio di dilavamento.

### MODALITÀ D'USO

Per sfruttare pienamente le caratteristiche di **CABRIO® TOP** se ne consiglia l'impiego nell'ambito di una strategia preventiva non superando i 2-3 trattamenti all'anno. Il dosaggio flessibile (1,5-2 kg/ha) consente al prodotto di adattarsi alle reali necessità della coltura ed alle condizioni meteo e, quindi, alla pressione del patogeno.

### AVVERTENZE

**CABRIO® TOP** offre risultati costanti quando è inserito in un corretto programma di difesa. Se ne consiglia pertanto l'impiego nell'ambito di uno schema di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione (es. per la lotta alla **Peronospora** è ideale l'alternanza con **FORUM®**).

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Prodotto con effetto:

 **AgCelence®**  
Aspettati di più

COLTURA	PATOGENI	CONDIZIONI D'IMPIEGO	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
<b>POMODORO</b>	Alternariosi, Cladosporiosi, Oidio, Peronospora, Septoria	In serra e in pieno campo	1,5-2	Preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie ad intervalli di 7-10 gg	3	7
<b>VITE</b>	Black rot, Escoriosi	In condizioni di elevata pressione di Peronospora	2	Preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie ad intervalli di 8-12 gg	3	35
	Oidio, Peronospora	In condizioni di bassa pressione di Peronospora	1,5	Preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie ad intervalli di 8-12 gg	3	35