

VITENE R WG

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

VITENE R WG

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Rame (sotto forma di poltiglia bordelose) g 20
Cymoxanil puro g 4
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H319 - Provoca gravi irritazioni oculari
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità.
Sospettato di nuocere al feto.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH208 - Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza

P264 - Lavare il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle accuratamente dopo la manipolazione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
P391 - Raccogliere la fuoriuscita
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare dell'autorizzazione:

UPL EUROPE Ltd. - The Centre, 1st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC); SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione 195 Pero (MI)

Officina di produzione: CEREXAGRI S.A. - Mourenx (Francia)

Stabilimento di confezionamento: SIPCAM S.p.A. - Salerano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15102 del 18/03/2011

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cymoxanil 4% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Rame metallo: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Cymoxanil:** Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

15102_A1.1 VITENE R WG_IT 07062017 NoA 15102

ATTENZIONE



CARATTERISTICHE

VITENE R WG è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro: Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame), Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria. La sua attività è di contatto e penetrazione sulle spore germinanti, endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo, preventiva, curativa ed antisporulante nei confronti dei funghi della famiglia delle peronosporacee.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE (da vino e da tavola) contro Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame): impiegare alla dose di 3 - 3,5 kg/ha. Per volumi di irrorazione superiori a 10 hl/ha mantenere la dose di 300 - 350 g/ha.

VITENE R WG può essere applicato per il controllo della peronospora nelle fasi fenologiche comprese tra il germogliamento e la chiusura del grappolo secondo due tipi di calendario: lotta ad intervalli regolari: intervenendo nelle fasi fenologiche critiche distanziando le applicazioni di 8-10 gg; lotta guidata: le applicazioni andranno effettuate secondo un criterio "preventivo" o, quando ciò non sia possibile, secondo un criterio "curativo", intervenendo in questo caso comunque entro 1-2 gg. dalla pioggia infettante. L'applicazione di tale metodo sarà basata sulla disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche in azienda o sulla presenza di servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche.

POMODORO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria impiegare alla dose di 300-350 g/ha;

LATTUGA, SPINACIO, MELONE, ZUCCHINO contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla dose di 300-350 g/ha;

AGLIO, CIPOLLA contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

PISELLO: contro: Peronospora, Antracnosi, Batteriosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

TABACCO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

ROSA contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per 2/3 della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la dose stabilita di **VITENE R WG** direttamente nell'acqua, quindi, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione, completare il riempimento del serbatoio con il rimanente quantitativo d'acqua previsto per il trattamento.

COMPATIBILITÀ: **VITENE R WG** è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare **VITENE R WG** in associazione con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA. Si consiglia di effettuare saggi preliminari in caso di impiego su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI LATTUGA, SPINACIO, PISELLO, TABACCO E VITE; 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO, AGLIO, CIPOLLA, MELONE E ZUCCHINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente