

GALIGAN EC

Registrazione Ministero della Sanità n. 9496 del 10.02.1998

Composizione

100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 24.2 g (=240 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene XILENE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 - Liquido e vapori infiammabili.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN LTD

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

ADAMA ITALIA srl

VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG)

Tel 035/328811

Stabilimento di

produzione/confezionamento:

ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO)

Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20 l

Partita n. vedi timbro



PERICOLO

GALIGAN EC

(emulsione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E OLIVO

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo E (HRAC)

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti. Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature robuste. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale della deriva del 98%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE: GALIGAN EC è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Infestanti sensibili in pre-emergenza

Amaranthus spp., *Avena* spp., *Borago officinale*, *Chenopodium* spp., *Cyperus rotundus*, *Diplotaxis* spp., *Erodium malacoides*, *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium* spp., *Lactuca* spp., *Lamium* spp., *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Mercurialis* spp., *Mibora minima*, *Portulaca oleracea*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza

Calendula spp., *Carduus* spp., *Convolvulus arvensis*, *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, e *Veronica* spp.

Infestanti sensibili in post-emergenza

Amaranthus spp., *Anacyclus* spp., *Calendula* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Coronopus didymus*, *Diplotaxis* spp., *Fumaria* spp., *Lamium* spp., *Lavatera cretica*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Picris* spp., *Portulaca oleracea*, *Scorpius muricatus*, *Senecio* spp., *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Sylibum marianum* e *Urtica* spp.

Infestanti moderatamente sensibili in post-emergenza

Diplotaxis spp., *Erigeron* spp., *Lolium* spp., *Medicago* spp., *Poa annua*, *Stellaria* spp. e *Veronica* spp.

Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Modalità di applicazione:

POMACEE (melo, pero, cotogno, nespole), DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino),

AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino),

VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola):

Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della superficie complessiva dell'impianto. Intervenire in:

Pre-emergenza delle infestanti:

Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2,5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Post-emergenza delle infestanti:

Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose di 1,2-2,5 l/ha della superficie effettivamente trattata.

Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di superficie complessiva dell'impianto

Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di Glifosate o Glufosinate ammonio.

I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio, impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie effettivamente trattata.

Effettuate 1 solo trattamento all'anno.

In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare GALIGAN EC con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e interventi di lotta meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USOOPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO