

ZELIG GR

(GRANULARE)

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE PRIMA O DURANTE LA SEMINA

ZELIG GR

Autorizzazione del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. 9940 del 12.02.1999

Composizione

Clorpirifos puro	7,5 g
Coformulanti q.b. a	100 g.



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O.B 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035 328.811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva (Israele)
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT Srl – Maniago (PN)

Distribuito da:

C.I.F.O. S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna (RA)

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 kg Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con

acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Lo ZELIG GR è un insetticida granulare, indicato nella lotta contro gli insetti del terreno ed in superficie. Viene impiegato sul terreno alle colture di: **Mais, Tabacco, Oleaginose (Girasole, soia), Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Cavoli (cavoli ad infiorescenza, cavolo rapa), Ornamentali, Floreali:** contro Elateridi, Diabrotica, Notte, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibionidi, Mosca del cavolo, Altica, Lixus alla dose di **30-40 kg per ettaro** di coltura, da applicare prima o durante la semina ed incorporandolo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura. Se viene impiegato con trattamenti localizzati impiegare **10-15 kg/ha** lungo i solchi.

Nei terreni molto leggeri impiegare la dose minima, (e se viene distribuito in miscela con concimi è necessario che la granulometria dei due prodotti non sia molto differente).

Lo ZELIG GR non trasmette sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per il bestiame e gli animali domestici. Tossico per le api e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI SOIA E GIRASOLE; 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI TABACCO, 30 GIORNI PER IL MAIS, 21 GIORNI CAROTA E CIPOLLA; 15 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il ri-

petto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**