


# PATROL® 35 WP

## Fungicida rameico

<b>Composizione</b>	Rame metallo 35% (sotto forma di ossicloruro)
<b>Formulazione</b>	Polvere bagnabile
<b>Reg. Ministero Salute</b>	n. 13429 del 25/10/2006
<b>Confezione</b>	1 kg - 10 kg
<b>Imballo</b>	10 x 1 kg - 1 x 10 kg 

® Marchio registrato e prodotto originale Spiess Urania



### CARATTERISTICHE

PATROL® 35 WP è un fungicida a base di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. Il formulato è attivo contro le *Peronosporaceae* e contro altri parassiti fungini ed è dotato di spiccata attività battericida. Il prodotto esplica la sua azione in modo preventivo attraverso la copertura della vegetazione.

Grazie al meccanismo d'azione multisito, si riducono i rischi di insorgenza di fenomeni di resistenza da parte degli organismi patogeni. PATROL® 35 WP si distingue per la classificazione favorevole ed il suo impiego è autorizzato anche in agricoltura biologica.

### Indicazioni di pericolo CLP

**Avvertenza**  
ATTENZIONE



### Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Avvertenze

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo\* e di pero\*\* cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

\*Cultivar di melo sensibili al rame: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

\*\*Cultivar di pero sensibili al rame: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

### Intervallo di sicurezza

3 giorni prima della raccolta di pomodoro, fragola, cetriolo, cetriolino, zucchini  
20 giorni per le altre colture

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE
Vite	Peronospora	300-500 g/hl	Azione collaterale su Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario. Dosi maggiori in caso di forte pressione della malattia e con tempo molto piovoso.
Agrumi	Cancro gommoso, Antracnosi, Allupatura, Mal secco, Marciume del colletto, Batteriosi	500 g/hl	Azione collaterale su Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose indicata a partire dalla fine di Gennaio.
Melo	Ticchiolatura	300 g/hl	Trattare prima della fioritura.
	Monilia e Cancro delle pomacee	800 g/hl	Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.
Pero	Ticchiolatura, Septoriosi	300 g/hl	Trattare prima della fioritura.
	Monilia e Cancro delle pomacee	800 g/hl	Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.
Cotogno	Monilia e Cancro delle pomacee	800 g/hl	Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme. Trattare fino ad inizio fioritura.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE
<b>Mandorlo, Albicocco,</b>	Monilia e Corineo	800 g/hl	Trattamenti invernali.
<b>Ciliegio</b>	Marciume del colletto	600 g/hl	Distribuire almeno 10-15 l di soluzione al colletto.
	Monilia, Bolla	800 g/hl	Trattamenti invernali.
<b>Pesco, Nettarine, Percoche</b>	Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla	800 g/hl	Trattamenti invernali.
<b>Susino</b>	Corineo, Monilia, Maculatura batterica	800 g/hl	Trattamenti invernali.
<b>Fragola</b>	Vaiolatura, Marciume del colletto	400 g/hl	Trattare alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
<b>Olivo</b>	Cicloconio, Rogna, Lebbra, Fumaggine, Piombatura	450 g/hl	Intervenire nelle epoche di maggiore rischio infettivo (autunno-primavera).
<b>Actinidia</b>	Marciume del colletto	600 g/hl	Trattare al colletto distribuendo 10-15 l per pianta.
<b>Carota</b>	Alternariosi	500 g/hl	Trattare alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
<b>Pomodoro</b>	Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero	500 g/hl	Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.
<b>Melanzana</b>	Antracnosi, Moria delle piantine	500 g/hl	Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.
<b>Zucchini, Cetriolo, Cetriolino</b>	Maculatura angolare, Peronospora.	500 g/hl	Azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico.
<b>Cavoli</b>	Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora	500 g/hl	Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.
<b>Asparago</b>	Ruggine	500 g/hl	Azione collaterale su Muffa grigia. Trattamenti consentiti subito dopo la raccolta dei turioni.
<b>Carciofo, Cardo</b>	Peronospora	500 g/hl	Azione collaterale su Marciume molle batterico.
<b>Finocchio, Sedano, Prezzemolo</b>	Cercosporiosi, Septoriosi	500 g/hl	Azione collaterale su Marciume molle batterico.
<b>Lattughe e altre insalate</b>	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi	500 g/hl	
<b>Oleaginose</b>	Peronospora, Antracnosi	3 Kg/ha	Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie.
<b>Patata</b>	Peronospora, Alternariosi	5 kg/ha	Escluse patate novelle.
<b>Tabacco</b>	Peronospora	5 kg/ha	Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie.
<b>Floreali, Ornamentali</b>	Peronospora, Cercospora, Ruggine, Antracnosi, Batteriosi.	450 g/hl	
<b>Cipresso</b>	Cancro del cipresso	1250 g/hl	