

GANZO

COMPOSIZIONE

Miclobutanil puro
13,4% (125 g/l)

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

CONFEZIONI

bottiglia 0,200 l
bottiglia 1 l

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 12399 del 24/12/2004



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

GANZO è un fungicida endoterapico ad attività preventiva, curativa ed eradicante. E' caratterizzato da un rapido assorbimento e traslocazione nei tessuti. Ganzo è particolarmente efficace nei confronti di Oidio. Ticchiolatura, Ruggini e Black- rot che attaccano colture arboree ed erbacee.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
ALBICOCCO	7 giorni	Monilia Oidio	40-50 ml/hl	Impiegare alla dose indicata in 3 trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta petali. Impiegare alla dose indicata iniziando i trattamenti alla scamicatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.
CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, ZUCCHINO	3 giorni	Oidio	40-50 ml/hl	Impiegare alla dose indicata ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.
FRAGOLA	3 giorni	Oidio	40 ml/hl	Impiegare alla dose indicata in post-trapianto ed in produzione trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.
MELO E PERO	15 giorni	Oidio Ticchiolatura	35-40 ml/hl	Impiegare alla dose indicata trattando alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 7-14 giorni in funzione della fase vegetativa e della pressione della malattia.
PEPERONE, POMODORO	3 giorni	Oidio	40-50 ml/hl	Impiegare alla dose indicata trattando ogni 8-12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.
PESCO	7 giorni	Monilia Oidio	50 ml/hl 40-50 ml/hl	Effettuare 2 trattamenti alla dose indicata all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura. Impiegare alla dose indicata, iniziando i trattamenti alla scamicatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.
SUSINO	7 giorni	Monilia	40-50 ml/hl	Impiegare alla dose indicata con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
VITE PER UVA DA TAVOLA	15 giorni	Marciume nero degli acini Oidio	15-30 ml/hl 20-30 ml/hl	Impiegare alla dose indicata ad intervalli di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore. Impiegare alla dose di 20 ml/hl fino alla fioritura, quindi a 30 ml/hl dalla allegazione in avanti, con trattamenti ogni 8-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione.
VITE DA UVA DA VINO	15 giorni	Oidio	15-30 ml/hl	Impiegare alla dose di 15-20 ml/hl sino alla fioritura, quindi a 30 ml/hl dalla allegazione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.
GAROFANO		Ruggini	40-50 ml/hl	
ROSA		Oidio Ticchiolatura	40-50 ml/hl	