

# MEVAXIL M

## Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile

MEVAXIL M Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono  
 METALAXIL, puro g. 8  
 MANCOZEB, puro g. 64  
 Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.

**CONTENUTO:****g 100-250-500 Kg 1-5-10-25****IQV ITALIA Srl**

Via del Progresso, 2  
 00065 Fiano Romano (Roma)  
 Tel. 0765 400086

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:

IQV Industrias Químicas del Valles s.a.  
 Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)  
 DIACHEM SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)  
 TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)  
 STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare le polveri e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti in nitrile e tuta da lavoro.

**REAZIONE:** P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**METALAXIL** - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**MANCOZEB** - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaticiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**

Il MEVAXIL M è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l'azione anticrittogamica.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**VITE:** contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.

**TABACCO:** contro Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti cadenzati di 10 giorni l'uno dall'altro.

Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora al fine di evitare eventuali infezioni.

**POMODORO:** contro Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i trattamenti.

Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.**

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE**

**DA NON IMPIEGARE IN SERRA**

**DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# MEVAXIL M

**Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile**

<b>MEVAXIL M</b> Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001	
<b>COMPOSIZIONE</b>	<b>IQV ITALIA Srl</b>
100 grammi di prodotto contengono	<b>Via del Progresso, 2</b>
METALAXIL, puro g. 8	<b>00065 Fiano Romano (Roma)</b>
MANCOZEB, puro g. 64	<b>Tel. 0765 400086</b>
Coformulanti q.b. a g.100	<b>CONTENUTO: g 100</b>
Partita n.....	
STABILIMENTI DI PRODUZIONE:	
<b>IQV Industrias Químicas del Valles s.a.</b> - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)	
<b>DIACHEM SpA</b> - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)	
<b>TORRE Srl</b> - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)	
<b>STI Solfotecnica Italiana SpA</b> - Cotignola (RA)	
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
<b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.	
<b>PREVENZIONE:</b> P261 Evitare di respirare le polveri e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti in nitrile e tuta da lavoro.	
<b>REAZIONE:</b> P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
<b>CONSERVAZIONE:</b> P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.	
<b>SMALTIMENTO:</b> P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.	
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:</b> EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	



**ATTENZIONE**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO**  
**NELL'AMBIENTE**