



ECODIAN CIDIA



Erogatori di feromone per azzerare e/o ridurre al minimo gli accoppiamenti di *Cydia molesta*, Tignola orientale del pesco, con la tecnica del disorientamento ("distrazione sessuale").

CONSIGLI

Gli erogatori vanno posizionati soprattutto sul terzo superiore delle piante, curando l'uniformità della distribuzione.

Nelle situazioni con alta popolazione di Cidia, si consiglia una dose di 2500-3000 erogatori/ha.

Nel disorientamento è fondamentale l'impiego delle trappole **TRAPTEST**; esse danno indicazioni sull'andamento del sistema. Il controllo delle trappole è molto importante e deve essere scrupoloso.

Installare le trappole per monitoraggio prima dell'inizio dei voli della generazione svernante. Si consiglia l'impiego di 2-3 trappole/ha più una ogni ettaro successivo. Controllare le trappole settimanalmente o a turni più brevi se necessario. Cambiare gli erogatori ogni 4 settimane. Mantenere puliti i fondi collati e sostituirli se necessario.

L'attività dei diffusori di **ECODIAN CIDIA** è influenzata dai parametri climatici, in condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 50-55 giorni.



Contiene

Z8-dodecenil acetato 9,3 mg/diffusore
E8-dodecenil acetato 0,6 mg/diffusore
Z8-dodecenolo 0,1 mg/diffusore



Confezione ECODIAN CIDIA

1 astuccio:
1000 diffusori a gancetto di colore grigio,
in materiale biodegradabile

Autorizzazione Ministero della Salute n° 11554 del 20.01.2003

