

**FILDER 500 SC (Sospensione concentrata)**

Fungicida preventivo per il controllo della Peronospora della Patata, del Pomodoro e della Vite  
**MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 40**

**FILDER 500 SC****COMPOSIZIONE**

Dimetomorf puro	g	43,8 (500 g/L)
Coformulanti	q.b. a g.	100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H302: Nocivo se ingerito. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one, sale sodico. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Registrazione Ministero della Salute n° 17265 del 30/07/2018

**TITOLARE REGISTRAZIONE**

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) - Tel. 0032 43859711

**Officine di produzione:** Arysta LifeScience Ougrée Production sprl, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); GL.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); SIPCAM SpA - Via Vittorio Veneto, 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO) (solo confezionamento)

**Distributori:** ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

Contenuto netto: L 0,5-1-5-10-20

Partita n°.....



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata e non trattata per il pomodoro di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Precauzioni per l'operatore: sulla vite indossare guanti durante la miscelazione e il carico e durante l'applicazione quando si effettuano i trattamenti a volume inferiore (400 l/ha).

I lavoratori che accedono ai vigneti trattati devono indossare guanti quando le operazioni si prolungano oltre le 5 ore.

Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato non sia completamente asciutto.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Avvertenza: consultare un centro antiveleni

**CARATTERISTICHE**

FILDER 500 SC è a base di dimetomorf, fungicida morfolinico che inibisce la formazione della parete dei funghi patogeni sensibili. È dotato di sistemica locale e attività preventiva, curativa e antisporulante. Il prodotto va utilizzato in miscela con formulati autorizzati a base di mancozeb, ossicloruro di rame o folpet.

**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**

**PATATA** contro Peronospora:

in miscela con formulati autorizzati a base di mancozeb: 300-360 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 400 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha), mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dallo stadio di 1 foglia con intervalli non inferiori a 7 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per anno.

Oppure

In miscela con formulati autorizzati a base di rame ossicloruro: 360 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 400 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha) mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dallo stadio di 1 foglia con intervalli non inferiori a 7 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per anno.

**VITE** contro Peronospora:

In miscela con formulati autorizzati a base di folpet: 340 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 1000 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha), mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dalla fase fenologica in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili, con intervalli non inferiori a 10 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per anno.

Oppure

In miscela con formulati autorizzati a base di mancozeb: 300 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 1000 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha) mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dalla fase fenologica in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili, con intervalli non inferiori a 10 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per anno.

Oppure

In miscela con formulati autorizzati a base di rame ossicloruro: 360 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 1000 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha) mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dalla fase fenologica in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili, con intervalli non inferiori a 10 giorni, per un massimo di 5 applicazioni per anno.

**POMODORO (da INDUSTRIA e da MENSA) in pieno campo** contro Peronospora:

In miscela con formulati autorizzati a base di rame ossicloruro: 360 ml/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 400 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 100 l/ha), mantenere la dose per ettaro. I trattamenti vanno effettuati a partire dallo stadio di 1 foglia con intervalli non inferiori a 7 giorni, per un massimo di 3 applicazioni per anno.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Versare le quantità stabilite di FILDER 500 SC e del partner in un ridotto quantitativo di acqua e miscelare fino ad ottenere una sospensione omogenea; versare quindi la sospensione nel serbatoio dell'irroratrice aggiungendo acqua fino al raggiungimento del volume stabilito e mantenendo la miscela in costante agitazione.

**FITOTOSSICITÀ**

Nel caso di varietà di recente introduzione consultare il personale tecnico prima di procedere all'impiego del prodotto.

Quando fungicidi con la stessa modalità d'azione sono utilizzati più volte nell'arco di diversi anni nello stesso settore, ceppi meno sensibili presenti in natura possono sopravvivere, propagarsi e diventare dominanti. Si consiglia pertanto, ove possibile, di includere l'uso di fungicidi con differenti meccanismi di azione.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE, 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMODORO DA INDUSTRIA, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU PATATA E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMODORO DA MENSA (PER IL CONSUMO FRESCO)**

**ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**