

FILDER 69 WG (Granuli idrodispersibili - WG)

Fungicida localmente sistemico per il controllo della peronospora su vite, pomodoro e patata

Codice FRAC: Dimetomorf 40, Mancozeb M 1

FILDER 69 WG

COMPOSIZIONE

Dimetomorf puro	g	9
Mancozeb puro.....	g	60
Coformulanti	q.b. a g.	100

Contiene sodium laurylsulfate

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n° 16926 del 08/03/18

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere lontano dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della registrazione: **ARYSTA LifeScience Benelux SPRL** 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (Belgio)
Tel. 0032 43859711

Stabilimenti di produzione: Cerexagri B.V. - Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat (Paesi Bassi); S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Via Evangelista Torricelli, 2, 48032 Cotignola (RA)

Distributore: **Arysta LifeScience Italia Srl** - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

Contenuto netto: 1 kg- 5 kg- 10 kg- 20 kg

Partita n°



PERICOLO

aziende agricole e dalle strade. Non rientrare negli appezzamenti trattati prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali di:

Vite: 15 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) oppure 10 metri con ugelli antideriva (riduzione 75%) o 5 metri con ugelli antideriva (riduzione 90%)

Pomodoro e Patata: 10 metri oppure 5 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) o nessuna con ugelli antideriva (riduzione 75%).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

FILDER 69 WG è una miscela di due principi attivi ad azione complementare: Dimetomorf penetra rapidamente nella vegetazione trattata e Mancozeb è dotato di attività di copertura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA- Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Trattare ogni 10 giorni a partire dalla fase di 5ª foglia distesa (BBCH 15) sino all'invaiaura (BBCH 83) alla dose di 2-2,2 kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2,2 kg/ha.

POMODORO in campo- Peronospora (*Phytophthora infestans*)

Trattare ogni 7-10 giorni a partire dalla fase di 3ª foglia (BBCH 13) sino alla pre-raccolta, alla dose di 2 kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2 kg/ha.

PATATA- Peronospora (*Phytophthora infestans*)

Trattare ogni 7 giorni a partire dalla formazione degli steli basali (BBCH 21) sino alla senescenza (BBCH 91), alla dose di 2 kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2 kg/ha.

NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER ANNO:

- VITE: 2
- POMODORO: 3
- PATATA: 4

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMODORO, 7 GIORNI SU PATATA E 28 GIORNI SU VITE

Per pomodoro e patata dopo la raccolta rispettare un intervallo minimo di 30 giorni prima della semina o trapianto di altri prodotti in rotazione.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08/03/18

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle