



AQ 10[®] WG

TABELLA DI COMPATIBILITÀ FUNGICIDI

Rev. Ottobre 2018

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITÀ'
AZOXYSTROBIN	QUADRIS	NO
<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE MAX	SI
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	AMYLO-X	SI
BENALAXIL	diversi	SI
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA	SI
BOSCALID	CANTUS	SI
BUPIRIMATE	NIMROD	-
CAPTAN	diversi	NO
CHLOROTHALONIL	DACONIL	NO
CYAZOFAMID	MILDICUT	SI
CYFLUFENAMID	TAKUMI	SI
CYMOXANIL	CURZATE 50%	SI
CYPROCONAZOLO	ATEMI/CADDY	SI
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	NO
DIFENCONAZOLO	SCORE	-
DIMETOMORF	FORUM 50 WP	P
DITHIANON	DELAN	NO
DODINA	SYLLIT	NO
FAMOXADONE	EQUATION PRO	NO
FENAMIDONE	ELICIO	SI
FENBUCONAZOLO	INDAR	-
FENHEXAMIDE	TELDOR	NO
FLUAZINAM	OHAYO	SI
FOLPET	diversi	NO
FLUOPYRAM	LUNA PRIVILEGE	NO
FOSETYL-Aluminium	ALIETTE 80%	SI
IDROSSIDO DI RAME	HELIOCUIVRE	SI
IMAZALIL	DECCOZIL	-
IPRODIONE	ROVRAL	SI
IPROVALICARB	MELODY COMPACT	SI
KRESOXIM METIL	STROBY	NO
MANCOZEB	DITHANE DG	NO
MANDIPROPAMID	PERGADO SC	P
MANEB	diversi	NO
MEPANIPYRIM	FRUPICA	SI
MEPTILDINOCAP	KARATHANE STAR	NO
METALAXIL	RIDOMIL	SI
METIRAM	POLYRAM DF	NO
MYCLOBUTANIL	THIOCUR	SI
OSSICLORURO DI RAME	diversi	SI
PENCONAZOLO	TOPAS	SI
POLTIGLIA BORDOLESE	RAME METALLICO 20%	SI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITA'
PROCHLORAZ	diversi	-
PROPAMOCARB	PREVICUR	-
PROPICONAZOLO	TILT	SI
PROPINEB	ANTRACOL	NO
PROPIZAQUID	TALENDO	SI
PYRIMETANIL	SCALA	SI
QUINOXYFEN	ARIUS	SI
SPIROXAMINA	PROSPER	SI
TEBUCONAZOLO	FOLICUR	SI
TETRACONAZOLO	DOMARK	-
TIOFANATO METILE	diversi	SI
THIABENDAZOLO	diversi	-
THIRAM	diversi	NO
TOLCLOFOS METILE	diversi	-
TRIADIMENOL	BAYFIDAN	SI
TRIFLOXISTROBIN	FLINT	NO
ZIRAM	diversi	NO
ZOLFO	diversi	NO
ZOLFO +ALCOOL TERPENICI	Heliosoufre S	NO
ZOXAMIDE	ELECTIS R	SI

LEGENDA

SI	COMPATIBILE, quindi miscibile in botte.
P = PARZIALE	PARZIALMENTE COMPATIBILE , si manifesta una riduzione della germinabilità delle spore di AQ10, perciò nel caso di utilizzo contemporaneo in botte dei prodotti si deve effettuare rapidamente il trattamento, entro 30 minuti dalla preparazione della miscela.
NO	NON COMPATIBILE, non miscibile in botte. Si consiglia di distanziare i trattamenti prima e/o dopo con il prodotto di almeno 5 giorni dal trattamento con AQ 10 wg.
-	NESSUN DATO DISPONIBILE

N.B. Le prove di compatibilità sono state eseguite miscelando AQ10 con ciascun prodotto al dosaggio riportato in etichetta. Non miscelare AQ10 con il fungicida nella sua forma concentrata. Si elenca il nome commerciale del fungicida per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata; differenti formulazioni della stessa sostanza attiva potrebbero avere effetti diversi sulla germinabilità delle spore di AQ 10.

I dati raccolti in questa tabella provengono da diverse fonti di informazioni: prove sperimentali condotte da Biogard, lavori scientifici di Istituti di ricerca ed esperienze operative dell'Area Tecnica Biogard.

In questa tabella Biogard fornisce dati al meglio delle proprie conoscenze circa la compatibilità di AQ10 con altri agrofarmaci; dal momento che l'applicazione degli agrofarmaci è al di fuori della sua possibilità di controllo, Biogard declina ogni responsabilità per i risultati ottenuti e per gli eventuali danni arrecati in seguito all'utilizzo delle informazioni contenute nella tabella. Gli agrofarmaci elencati nella presente tabella devono essere applicati secondo le istruzioni di etichetta autorizzata.