

SIGNUM®

FUNGICIDA POLIVALENTE PER LA PROTEZIONE DI DRUPACEE, FLOREALI, ORNAMENTALI E ORTIVE



COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono: 6,7 g di *F500*° (*Pyraclostrobin*) e 26,7 g di *Boscalid*



FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)



CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE



REG. MIN. SALUTE

N° 12869 del 13-07-2006



CONFEZIONE





IMBALLO

Cartone
- da 10 taniche

Caratteristiche

SIGNUM® è un fungicida ad ampio spettro d'azione autorizzato su Drupacee, Fragola, Nocciolo, Ornamentali, Orticole e Pesco. L'associazione di Boscalid e Pyraclostrobin consente di ampliare lo spettro d'azione del formulato ad una vasta gamma di funghi patogeni importanti, tra cui Antracnosi, Botrite, Monilia, Necrosi grigia, Oidio e Sclerotinia. Entrambe le sostanze attive sono caratterizzate da attività translaminare. Ciò garantisce il pronto assorbimento del formulato nei tessuti della pianta. SIGNUM® è provvisto di una intrinseca strategia antiresistenza in quanto le due sostanze attive agiscono su due diversi siti della respirazione mitocondriale. Se ne consiglia comunque l'uso in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. per la lotta alla Botrite è ideale l'alternanza con SCALA®).

Modalità d'uso

SIGNUM® deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.

Avvertenze

Per favorire la miglior dispersione del prodotto in soluzione acquosa:

- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria.
- Continuare ad agitare la soluzione ed aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.



Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/hl)	DOSE (kg/ha)	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (gg)	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
AGLIO* CIPOLLA* SCALOGNO* (Foglie)	Botrite, Marciumi bianco e verde, Ruggine	150	1,5	7	2	14
ALTRA PICCOLA FRUTTA A BACCHE*	Botrite	150	1,5	7-10	2	3
ASPARAGO*	Ruggine, Stemfiliosi	100-150	1-1,5	10-15	3	120
BIETOLA*** DA FOGLIA E DA COSTA	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2	14
BROCCOLI*	Alternariosi, Muffa grigia	100	1	7-10	3	14
CARCIOFO*	Oidio	75-100	0,75-1	7-10	2	3
	Botrite	150	1,5			
CAROTA*	Alternariosi, Oidio	100	1	7	2	14
CASTAGNO*	Fersa e Marciume delle castagne	100	1	10-15	2	28
CAVOLFIORE*	Alternariosi	100	1	7-10	3	14
CECE*	Sclerotinia e Antracnosi	100-150	1-1,5	10	2	7
DRUPACEE*	Moniliosi, Oidio	60-75	0,60-0,75	7-14	3	3
ERBE AROMATICHE*** ●	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	7-10	2	14
FAGIOLO E FAVA*	Botrite, Ruggine e Sclerotinia	100-150	1-1,5	10	2	7
FAGIOLINO*	Botrite, Ruggine e Sclerotinia	100-150	1-1,5	10	2	7
FINOCCHIO*	Septoriosi	100	1	10	2	14

^{*} PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA • Leggasi Erbe fresche ai sensi del Reg. (UE) n° 2018/62

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/hl)	DOSE (kg/ha)	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (99)	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
FLOREALI ORNAMENTALI**	Botrite, Oidio	100-150	1-1,5	7-10	3	-
FRAGOLA***	Antracnosi, Botrite, Oidio	150-180	1,5-1,8	7-10	2	3
FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE*	Botrite	150	1,5	7-10	2	3
LATTUGHE*** E SIMILI	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	7-10	2	14
MANDORLO*	Moniliosi, Bolla	100	1	10-15	2	28
MELANZANA***	Botrite, Oidio	150	1,5	7-10	3	3
NOCCIOLO*	Necrosi grigia	100	1	10-15	2	28
NOCE*	Necrosi apicale bruna	100	1	10-15	2	28
PEPERONE***	Botrite, Oidio	100-150	1-1,5	7-10	3	3
PISELLO*	Sclerotinia, Antracnosi, Oidio e Peronospora	100-150	1-1,5	10	2	7
PISTACCHIO*	Cancro	100	1	10-15	2	28
POMODORO***	Botrite, Cladosporiosi, Oidio	100-150	1-1,5	7-10	3	3
PORRO*	Botrite e Peronospora	100-150	1-1,5	10-14	2	14
SCAROLA*	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	7-10	1	21

^{*} PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA • Leggasi Erbe fresche ai sensi del Reg. (UE) n° 2018/62

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/hl)	DOSE (kg/ha)	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (gg)	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
SEDANO*	Septoriosi e Sclerotinia	100	1	10	2	14
SPINACIO***	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2	14
SUSINO*	Cladosporiosi, Moniliosi, Oidio	60-75	0,6-0,75	7-14	3	3
VALERIANELLA* (Raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia)	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	7-10	2	14

^{*} PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA • Leggasi Erbe fresche ai sensi del Reg. (UE) n° 2018/62