

# Teldor® Plus



## TELDOR® plus

Fungicidi

Teldor Plus è il fungicida per la difesa da botrite, monilia e sclerotinia.

La formulazione liquida offre un'ottima efficacia preventiva e una lunga durata d'azione.



| COLTURE  | AVVERSITÀ              | DOSE litri/ha | MODALITÀ D'IMPIEGO   | TEMPO di CARENZA gg |
|--|------------------------|---------------|--|---------------------|
| Vite   | Botrite                | 1 - 1,5       | Impiegare preferibilmente nella fase di pre-chiusura grappolo. | 7                   |
| Pesco<br>Albicocco<br>Susino<br>Ciliegio   | Botrite<br>Monilia     |               | -  | 3                   |
| Fragola<br>(in pieno campo e in serra)<br>Pomodoro<br>Melanzana<br>Peperone<br>Cetriolo<br>Zucchino                            | Botrite                |               | -  |                     |
| Lattughe ed altre insalate<br>comprese le brassicacee**<br>(in pieno campo e in serra)<br>Erbe fresche<br>Fagiolino (in serra) | Botrite<br>Sclerotinia | 1,5           | -  |                     |
| Cipolla (in pieno campo)   | Botrite, Sclerotinia   | 1,5           |  | 7                   |
| Actinidia<br>(trattamenti di post-raccolta)  | Botrite                | 0,12 L/hl     | Trattamenti post-raccolta per irrorazione o per immersione.    | 60*                 |

\* Intervallo di sicurezza tra il trattamento di post-raccolta e la commercializzazione della produzione

\*\*Verificare sempre gli impieghi riportati in etichetta



12 x 1 L



4 x 5 L

**Composizione:** Fenexamid 42,8% (= 500 g/L)

**Formulazione:** Sospensione concentrata

**Classificazione:**



**Registrazione:** n. 13084 del 10.02.2010

® = Marchio registrato