

NEW

# CORDOBA

## COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura  
g 9,4 (100 g/l)

## FORMULAZIONE

Sospensione di capsule

## CONFEZIONI

bottiglia 0,5 l

## CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.  
n. 16423 del 21/10/2015



## CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

**CORDOBA** è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. **CORDOBA** unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

**CORDOBA** si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. **CORDOBA** si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

## FITOTOSSICITA'

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.



Colture	Parassiti	Dose (ml/100 l)	Dose (ml/ha)	Numero trattamenti	Tempo di carenza	Intervallo tra i trattamenti
DRUPACEE (ABICOCCO, PESCO, NETTARINA)	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	10-15	1	7 giorni	
	Mosca della frutta	15-25	150-250	1		
POMACEE (MELO, PERO)	Afidi (foglie non accartocciate)	15-20	150-200	1	7 giorni	14 giorni 14 giorni
	Carpocapsa	15-25	150-250	1-2		
	Psilla del pero	20-25	200-250	1-2		
NOCCIOLO	Balanino	20-25	200-250	1	7 giorni	
VITE	Tignola e Tignoletta	25-30	250-300	1	21 giorni	
	Cicaline	15-25	150-250	1		
CEREALI (Avena, Fru- mento, Orzo)	Afidi	15-20	150-200	1	30 giorni	
MAIS	Piralide	20-25	200-250	1	28 giorni	
	Afidi	15-20	150-200	1		
	Nottue	10-12,5	100-125	1		
LATTUGA	Afidi	10-15	100-150	1-2		14 giorni
ZUCCHINI	Afidi	10-15	100-150	1	3 giorni	
POMODORO	Lepidotteri	15-20	150-200	1-3	3 giorni	14 giorni 14 giorni
	Afidi	10-15	100-150	1-2		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1		
PATATA	Doriflora	15-20	150-200	1-2	15 giorni	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1		
BRASSICAC- CAE (CAVOLFIGIO- RE, CAVOLO, BROCCOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLINI DI BRUXELLES)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	7 giorni	
	Afidi	10-15	100-150	1		
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1		
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi	10-15	100-150	1		