

# ROMULAN®

REGOLATORE DI CRESCITA PER POMACEE, DRUPACEE E VITE

## COMPOSIZIONE:

PACLOBUTRAZOL PURO ..... 23,6 (250 g/l)

**FORMULAZIONE:** Sospensione Concentrata

**REGISTRAZIONE:** n° 16485 del 24/11/2015 del Minist. della Salute

**CLASSIFICAZIONE:** ATTENZIONE



**CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:** E' un regolatore di crescita ad azione sistemica che agisce riducendo la sintesi delle gibberelline. L'assorbimento del prodotto da parte delle piante avviene attraverso le radici nelle applicazioni al suolo e attraverso le foglie e i germogli nelle applicazioni fogliari.

L'effetto principale è la riduzione della crescita vegetativa. La vigoria viene controllata riducendo la lunghezza degli internodi dei nuovi germogli e la formazione precoce di germogli laterali. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, nella quantità dei frutti e nella resa delle raccolte.

Favorisce la formazione di alberi più piccoli e facili da gestire, riducendo il numero e l'intensità delle loro potature. Gli alberi trattati con ROMULAN devono essere sani e vigorosi.

**Pomacee (Melo e Pero): per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.**

Si applica per via fogliare alla dose di 200 ml/ha di ROMULAN con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un massimo di 4 trattamenti con un intervallo di 7 giorni. Eseguire la prima applicazione durante lo sviluppo del frutto, dalla allegazione in poi (BBCH 73). Lasciare un intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta di almeno 60 giorni.

**Drupacee (Pescio, Nettarine e Susino): per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.**

Applicare in impianti dotati di sistemi di irrigazione a goccia alla dose di 0.8 l/ha di ROMULAN. Sciogliere la dose prevista da applicare per ogni albero in 250-500 ml d'acqua e distribuire la soluzione proporzionalmente al numero di gocciolatoi di ogni albero. Si consiglia irrigare prima per formare un piccolo ristagno sotto i gocciolatoi.

Eseguire i trattamenti a partire dallo stadio di gemme invernali (BBCH 10) fino allo stadio di bottoni rosa (BBCH 57)

**Vite: per ridurre la lunghezza dei germogli e per evitare la caduta dei fiori. Può influenzare favorevolmente la resa del raccolto.**

Applicare per via fogliare in pre-fioritura, circa 2 settimane prima dell'inizio della stessa, alla dose di 0.2-0.25 l/ha, impiegando volumi d'acqua di 150-200 l/ha. L'applicazione del ROMULAN si può far coincidere con i normali trattamenti contro Peronospora e Oidio. Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:** Non impiegare ROMULAN in presenza di vento al fine di evitare la deriva del prodotto a colture limitrofe. Piante di grandi dimensioni o molto vigorose possono essere più difficili da mantenere sotto controllo e i risultati possono risultare insoddisfacenti. Non usare ROMULAN su alberi che presentano scarsa vigoria, crescita stentata o sotto stress. I trattamenti di ROMULAN possono favorire un anticipo della fioritura. Per assicurare l'impollinazione incrociata, devono anche essere trattati gli alberi impollinatori.

Non impiegare ROMULAN l'anno precedente l'estirpazione della coltura. La coltivazione di cereali l'anno successivo non presenta problemi, mentre per la messa a dimora di altre colture si raccomanda di eseguire una prova su piccola scala.

Non applicare ROMULAN su piante giovani appena messe a dimora che di solito richiedono uno sviluppo vegetativo vigoroso.

Non usare Romulan su impianti di Pomacee, drupacee e vite che prevedono coltivazioni intercalate di piante annuali.

Se per un qualsiasi motivo si genera un controllo eccessivo della vigoria delle piante, si raccomanda non riapplicare Romulan fino a quando le piante non abbiano recuperato il vigore desiderato.

Sciacquare accuratamente tre volte il contenitore versando l'acqua di lavaggio nella botte dell'irroratrice.

**COMPATIBILITÀ:** Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli. Prima di utilizzare ROMULAN in miscela estemporanea con altri prodotti è consigliabile di effettuare una prova di compatibilità/selettività su piccola scala.

**Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta delle pomacee.**



**Confezioni:**  
Flacone da 1 l

\*Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto\*