



Avvertenza: -
Indicazioni di pericolo:
H411 - EUH401



INQUADRA IL LOGO
CON LA NOSTRA APP

Scirocco® 125 EW è un prodotto
di titolarità Isagro S.p.A.
Marchio e distribuzione
di Adama S.r.l.



0,5 l

1 l

FORMULAZIONE:
Microemulsione

COMPOSIZIONE:
Tetraconazolo 11,6% (125 g/l)

FRAC:
3 (G1)

N. REGISTRAZIONE:
15990 del 14-02-2014

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Oidio attività collaterale verso Marciume nero	20-25 ml/hl (0,24 l/ha)	Trattamenti in pre e post-fioritura distanziati di 12-14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni	30 giorni
Frumento tenero e duro, Orzo	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi	0,9-1 l/ha	Trattare quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si consigliano 2 applicazioni: - stadio di 1-2 nodi - inizio spigatura	Sospendere i trattamenti a fine fioritura
Barbabetola da zucchero	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	0,8 l/ha	Effettuare il trattamento alla comparsa dei sintomi da fine sviluppo fogliare alla fase di pre-fioritura	14 giorni
Melo	Oidio	16-24 ml/hl (0,19-0,24 l/ha)	Trattamenti primaverili-estivi con intervallo di 12-14 giorni	14 giorni
	Ticchiolatura	24 ml/hl (0,24 l/ha)	Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni. Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni, proseguire poi con le cadenze normali	
Pero	Ticchiolatura	24 ml/hl (0,24 l/ha)	Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni. Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni, proseguire poi con le cadenze normali	14 giorni
Pesco, Albicocco	Oidio	30 ml/hl (0,3 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguire a intervalli di 12-14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni	14 giorni
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini (in pieno campo e serra)	Oidio	50 ml/hl (0,4 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 10-15 giorni	3 giorni per Cetriolo e Zucchini e 7 giorni per Melone e Cocomero
Carciofo	Oidio	20-30 ml/hl (0,2 - 0,3 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi proseguendo ogni 15 giorni se necessario	3 giorni
Pomodoro, Peperone e Melanzana (in pieno campo)	Oidio	20-36 ml/hl (0,2-0,4 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 8-12 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni	7 giorni
	Cladosporiosi	40-60 ml/hl (0,4-0,36 l/ha)		
Rosa	Oidio Ruggine	20-40 ml/hl 40 ml/hl		-
Crisantemo	Ruggine	60-75 ml/hl	Interventi preventivi distanziati di 7-14 giorni	-
Garofano	Ruggine	70-75 ml/hl		-
Pelargonio, Gladiolo	Ruggine	75 ml/hl		-
Fragola (in serra e pieno campo)	Oidio	40 ml/hl (0,4 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Eseguire massimo 3 trattamenti/anno distanziati di almeno 7 giorni	1 giorno

MISURE DI MITIGAZIONE

Nessuna misura di mitigazione riportata in etichetta.