

Composizione	Rame metallo (sotto forma di rame solfato tribasico) 15,2% (195 g/L)
Formulazione	Liquido
Gruppo	FRAC MI
N. registrazione	11569 del 30-01-2003
Confezione	1 L (x 10), 10 L



Fungicida a base solfato di rame tribasico in formulazione liquida

CARATTERISTICHE

CUPROXAT S.D.I. è un fungicida liquido a base di solfato di rame tribasico. La formulazione è caratterizzata da una superiore finezza delle particelle che conferiscono al prodotto un ottimo potere ricoprente; ciò ne consente l'impiego a dosi inferiori rispetto ad altri prodotti rameici con conseguente riduzione dei residui nel terreno, sulla vegetazione e nel vino.

Consentito in Agricoltura Biologica.



COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE	Peronospora, Black-rot	300-500 ml/hl ogni 7-10 giorni dalla formazione degli acini. In caso di forte attacco attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo del trattamento	20 gg
MELO, PERO, COTOGNO	Ticchiolatura, Cancri rameali, Nectria, Batteriosi	300 ml/hl in trattamenti primaverili prima della fioritura; 700-800 ml/hl in trattamenti autunno-invernali	Sospendere i trattamenti a inizio fioritura
PESCO, CILIEGIO, SUSINO, MANDORLO	Corineo, Fusicocco, Bolla, Monilia, Cancri rameali Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i>)	700-800 ml/hl in trattamenti autunno-invernali con piante in pieno riposo vegetativo fino all'inizio dell'apertura delle gemme 600-700 ml/hl in trattamenti alla caduta delle foglie	Limitare i trattamenti al periodo invernale
OLIVO	Occhio del pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi	500-600 ml/hl in trattamenti autunnali, in pre-fioritura e in vegetazione	20 gg
AGRUMI	Mal secco, Allupatura, Fumaggini, Antracnosi, Batteriosi	500-600 ml/hl prima e dopo la fioritura in funzione della gravità dell'attacco	20 gg
NOCE	Antracnosi Batteriosi (azione collaterale)	650 ml/hl in trattamenti primaverili e alle dosi più ridotte 200-300 ml/hl in trattamenti primaverili estivi	20 gg
NESPOLO	Ticchiolatura	300-400 ml/hl in trattamenti autunno-invernali e fino a prima della fioritura	

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
FRAGOLA	Vaiolatura, Maculatura rosso-bruna, Batteriosi (<i>Xanthomonas fragariae</i>)	500 ml/hl in trattamenti autunno-invernali fino a prima della fioritura	3 gg
ACTINIDIA	Batteriosi	600-800 ml/hl in trattamenti ad ingrossamento gemme e caduta foglie	-
ORTAGGI (Pomodoro, Melanzana, Spinacio, Bietola da costa e da foglia, Lattughe ed erbe fresche*, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cavolo nero, Cetriolo, Zucchini, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Carciofo, Cardo, Sedano e Finocchio)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Antracnosi, Ruggini, Bremia, Cercospora, Phoma, azione collaterale su Sclerotinia Batteriosi	300-400 ml/hl dal verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia ad intervalli di 7-12 giorni. In funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Per le colture trapiantate da dopo il trapianto ad intervalli di 7-12 giorni in funzione delle condizioni climatiche 400-500 ml/hl	3 gg
ASPARAGO	Batteriosi e altre malattie fungine	400-500 ml/hl dopo la raccolta dei turioni	
PEPERONE		2,4 l/ha in vegetazione, al verificarsi delle condizioni climatiche predisponenti l'attacco fungineo.	3 gg
OLEAGINOSE (Soia, Colza, Girasole)	Peronospora, Antracnosi	5 l/ha	20 gg
TABACCO	Peronospora, Antracnosi	400 ml/hl	20 gg
CEREALI	Carie Ruggine, Septoria	100 ml/q.le di seme; disinfezione dei semi (conciante - escluso mais, sorgo, riso) 800 ml/hl al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie	20 gg
FLOREALI, ORNAMENTALI	Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antracnosi, Batteriosi	300-400 ml/hl al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie	-
FORESTALI	Cancri rameali	400-500 ml/hl al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie	-

* lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, ruta, dragoncello.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CIPRESSO	Cancro	500-600 ml/hl in trattamenti invernali alle dosi più elevate e in trattamenti primaverili- estivi	-
ROSA	Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine	300 ml/hl verificare preventivamente la selettività varietale	-
CICLAMINO	Antracnosi, Maculatura fogliare	300 ml/hl applicazioni settimanali	-