

EPIK® SL

Composizione	Acetamiprid 4,67% (50 g/L)
Formulazione	Liquido solubile
Gruppo	IRAC 4A
N. registrazione	16325 del 26-02-2015
Confezione	1 L (x 10), 5 L (x 4)



Insetticida sistemico ad elevata attività specifica su Cimice asiatica, cicaline, scafoideo, cocciniglie, mosche, afidi e altri fitofagi di un ampio numero di colture

CARATTERISTICHE

EPIK SL è il nuovo insetticida sistemico che si distingue per l'elevata efficacia specifica su parassiti particolarmente temuti o di recente insediamento su un ampio numero di colture. Epik SL è autorizzato su Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su pomacee e drupacee. Per individuare il momento ideale degli interventi monitorare costantemente la presenza degli insetti con le soluzioni PHEROCON (p. 158)

TUTELA DELL'AMBIENTE

Rispettare una distanza dai corpi idrici superficiali di:

30 m per pomacee e pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, amarena e prugnolo

20 m per agrumi, vite da vino e da tavola, fragole, lampone e more di rovo.

Rispettare una fascia vegetata non trattata di:

20 m per olivo, lattughe e simili, spinaci e simili e erbe fresche

10 m per solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, cavoli a testa e infiorescenza, legumi freschi da granella, carciofo, patata, frumento, tabacco, floreali e ornamentali e vivai di piante madri di vite

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
AGRUMI (Arancio, Mandarino compreso Clementine ed altri ibridi, Limone, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Arancio amaro, Mapo, Tangelo)	Afidi, Aleurodidi (<i>Aleurotrixus</i> sp., <i>Aleurococcus</i> sp.), Cimici (<i>C. trivialis</i> , etc), Mosca (<i>C. capitata</i>), Minatrice serpentina, Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Aonidiella</i> sp.)	100 - 150 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Cicaline (<i>E. decedens</i> , etc)	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Afidi (compreso Afide lanigero, <i>E. lanigerum</i>), Maggiolino (<i>M. melolontha</i>), Mosca (<i>C. capitata</i>)	100 - 150 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Psille (adulti), Tentredini, Minatori fogliari (<i>Leucoptera</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.), Cicaline, Metcalfa , Antonomo, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, AMARENA, PRUGNOLO	Afidi, Mosche (<i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Tortrice (<i>Cacoecia rosana</i>)	130 - 200 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Minatori fogliari, Cicaline (<i>Empoasca</i> sp., <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i>), Metcalfa , Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
VITE (da vino e da tavola)	Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Heliooccus</i> sp., <i>Partenolecanium</i> sp.), Mosca (<i>C. capitata</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Fillossera, Afidi, Tripidi estivi (escluso <i>F. occidentalis</i> su uva da tavola), Aleurodidi (<i>Aleurococcus</i> sp.) Tignola e Tignoletta	200 ml/hL (2 L/ha)	14 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE (da vino e da tavola)	Cicadellidi (<i>Empoasca</i> sp., <i>Z. rhamni</i> , <i>S. titanus</i> , <i>H. obsoletus</i>), Minatori fogliari (<i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.), Cimici <i>Anomala vitis</i> , <i>Melolontha</i> sp. Metcalfa	150 ml/hL (1,5 L/ha)	14 gg
LAMPONE, MORE DI ROVO	<i>Drosophila suzukii</i> , Afidi, Cicaline (<i>A. decedens</i>), Antonomo (<i>A. rubi</i>), Metcalfa e Cimici	180 - 220 ml/hL (1,8 L/ha)	7 gg
OLIVO	Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>), Tignola (<i>Prays oleae</i>), Sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>)	150 ml/hL (1,5 L/ha)	21 gg
FRAGOLA Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Drosophila suzukii, Antonomo	125 - 150 ml/hL (1,25 L/ha)	3 gg
SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone). Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari (<i>Liriomyza</i> sp.), Cimici (<i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , etc), Cicadellidi (<i>Empoasca</i> sp., <i>H. obsoletus</i>) Piralide	200 - 300 ml/hL (2 L/ha) 160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	7 gg (pieno campo) 3 gg (serra)
CUCURBITACEE con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
CUCURBITACEE con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	7 gg (pieno campo) 3 gg (serra)
LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESSE LE BRASSICACEE (Lattughe, Dolcetta, Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi, Rucola, Prodotti baby leaf compresse le brassicacee), Spinaci e simili Pieno campo e serra	Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi	200 - 250 ml/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)
ERBE FRESCHE (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, ecc) Pieno campo e serra	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari, Miridi	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
CARCIOFO	Afidi	150 - 250 ml/hL (1,5 L/ha)	7 gg
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavoli, Broccoli, Cavolfiori, etc), CAVOLI A TESTA (eccetto i Cavoletti di Bruxelles)	Afidi, Altiche, Cimici	160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	14 gg
LEGUMI FRESCHI (Fagioli, Fagiolini, Piselli) LEGUMI DA GRANELLA (Fagioli, Piselli, Fave, Cece e Cicerchia)	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari	160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	14 gg
PATATA	Afidi, Dorifora, Miridi	150 - 250 ml/hL (1,3 L/ha)	14 gg
FRUMENTO	Afidi, Cimici, Oulema sp.	1 L/ha	28 gg
ERBA MEDICA	Afidi, Fitodecta, <i>Apion</i> sp.	0,5 L/ha	14 gg
TABACCO	Afidi, Pulce (<i>Epidrix</i> sp.)	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
COTONE	Afidi	150 - 250 ml/hL (1,3 L/ha)	14 gg
FLOREALI ED ORNAMENTALI Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cimici, Cicaline, Minatori fogliari, Maggiolino, Cicadellidi	200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)	-
VIVAI DI PIANTE MADRI DI VITE	Afidi, Fillossera, Cicadellidi, Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Helioacoccus</i> sp.), Minatori fogliari (<i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.)	200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)	-

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale

IMPIEGO SU COLTURE PORTASEME
destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo
(da seme)

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO
<p>SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone, etc.), CUCURBITACEE con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.), CUCURBITACEE con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.), LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESSE LE BRASSICACEE, SPINACI E SIMILI, ERBE FRESCHE, CORIANDOLO, CAVOLI AD INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVE, PISELLI, CECI, LENTICCHIE, LUPINI, CICERCHIE, CARCIOFO, ERBA MEDICA, COLZA, FRUMENTO Pieno campo e serra</p>	<p>Afidi, Aleurodidi, Cimici, Tripidi, Altiche, Cicadellidi, Minatori fogliari, Apion, Fitodecta, Cavallette</p>	<p>200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)</p>