

CEREXIL M DG

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA

CEREXIL M DG

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
Metalaxyl puro g 8
Mancozeb puro g 64
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di Pericolo

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H361d Sospettato di nuocere al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P273 Non disperdere nell'ambiente. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P321 Trattamento specifico (vedere P304 + P341 su questa etichetta). P304 + P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P342+P311 In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

UPL EUROPE Ltd. - The Centre, 1st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

DISTRIBUITO DA:

UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:

UPL Europe Ltd., Sandbach (UK); CEREXAGRI B.V., ROTTERDAM (NL); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

STABILIMENTI DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione n. 10272 del 10/01/ 2000 del Ministero della Sanità

Taglie: kg 0,200 - 1 - 5 - 10

Partita n.

PERICOLO



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: Metalaxil 8%, Mancozeb 64 % le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esotolmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia sintomatica. MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.**

CARATTERISTICHE: CEREXIL M DG è un fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa in microgranuli idrosolubili WG indicato per la lotta contro la peronospora delle colture sotto indicate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) g 250/hl Eseguire il trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente intervenire ad intervalli di 10-14 giorni. Anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un'elevata e

continua pressione di infezione l'attività sistemica e la persistenza d'azione di CEREXIL M DG sono tali da assicurare in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro. In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo, nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.

TABACCO: contro peronospora g 250/hl dopo la crisi del trapianto ogni 12 - 14 giorni.

POMODORO: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) g 250/hl da quanto avvengono le condizioni favorevoli all'infezione primaria.

FLOREALI ROSA GAROFANO: contro peronospora gr. 250/hl ogni 15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVE E TABACCO E 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI POMODORI.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

A1.0 CEREXIL M DG_IT 22062016 NoA 10272

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 06/10/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 22/06/2018

- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente