

CUPROFIX C DISPERSS®

FUNGICIDA AD AZIONE CITOTROPICA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

CUPROFIX C DISPERSS

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g 20
Cymoxanil puro g 4
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 - Provoca grave irritazione oculare
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
EUH208 - Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 - Racogliere la fuoriuscita
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare dell'autorizzazione:

UPL EUROPE Ltd. - "The Centre", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC); SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione 195 Pero (MI)

Stabilimenti di produzione: CEREXAGRI S.A.S. - Mourenx (F); CEREXAGRI S.A.S. - Marsiglia (F); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11637 del 14/03/2003

Contenuto netto: kg 1, 5, 10, 20

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Indossare protezione oculare/facciale, tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l'applicazione. Non entrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare guanti e abbigliamento da lavoro prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture trattate. Non impiegare nel periodo di riproduzione degli uccelli con una dose superiore a 4,5 kg di rame/ha. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su vite (applicazioni precoci), patata, pomodoro, zuccchina, cipolla, aglio e rosa e rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali, oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni tardive su vite.

ATTENZIONE



INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cymoxanil 4% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: **Rame metallo:** Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Cymoxanil:** Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subituro ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: CUPROFIX C DISPERSS è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro: Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Batteriosi. La sua attività è di contatto e penetrazione sulle spore germinanti, endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo, preventiva, curativa ed antisporulante nei confronti dei funghi della famiglia delle peronosporacee.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulato nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

DOSIE MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose (kg/ha) min - max	Dose (g/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
VITE DA VINO E DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>), Antracnosi (<i>Elsinoe ampelina</i> , <i>Colletotrichum</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dalla formazione dei germogli fino al virare di colore degli acini* Numero trattamenti/anno: 4	28
POMODORO (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Intervallo minimo: 7 giorni Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino a quando il 10% di frutti maturi. Numero trattamenti/anno: 6	3 (pomodoro da mensa) 10 (pomodoro da industria)
ZUCCHINO (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Intervallo minimo: 7 giorni Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino a quando il 10% dei frutti mostra la tipica colorazione Numero trattamenti/anno: 4	7
PATATA (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8-3,0	280 - 300	Intervallo minimo: 7 giorni Impiegare dal primo getto basale fino al 50% di foglie brunastre Numero trattamenti/anno: 5	14
AGLIO, CIPOLLA (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>), Batteriosi	2,8 - 3,0	280 - 300	Intervallo minimo: 7 giorni Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino all'inizio della bulbificazione	7

Coltura	Avversità	Dose (kg/ha) min - max	Dose (g/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
	<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp.)			Numero di trattamenti/anno: 4	
ROSA (in campo)	<i>Peronospora</i> (<i>Peronospora</i> sp.)	2.8 - 3.0	280 - 300	Intervallo minimo: 7 giorni Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco principale fino ad inizio fioritura. Numero trattamenti/anno: 3 Intervallo minimo: 7 giorni	--

* Le applicazioni andranno effettuate secondo un criterio "preventivo".

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.

Per l'impiego con irrigatori a recupero di volume, e nel caso della vite nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare CUPROFIX C DISPERS in diretta nella botte riempita per $\frac{3}{4}$ con acqua mantenendo l'agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: CUPROFIX C DISPERS è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di non usare CUPROFIX C DISPERS in associazione con prodotti a reazione alcalina. In caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si consiglia di effettuare saggi preliminari in caso di impiego su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all'intervallo di sicurezza riportato in tabella.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

**Segue etichetta utilizzabile
fino al 18/03/2020**

CUPROFIX®C DISPERSS®

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

CUPROFIX®C DISPERSS®

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Rame (sotto forma di poltiglia bordolese) g 20
Cymoxanil puro g 4
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H319 - Provoca gravi irritazioni oculari
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH208 - Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza

P264 - Lavare il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle accuratamente dopo la manipolazione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare dell'autorizzazione:

UPL EUROPE Ltd. - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione e/o confezionamento:

CEREXAGRI S.A. - Mourenx (Francia) / CEREXAGRI S.A. - Marsiglia (Francia) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11637 del 14/03/2003

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°.....

ATTENZIONE



CARATTERISTICHE

CUPROFIX®C DISPERSS® è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro: Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame), Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria. La sua attività è di contatto e penetrazione sulle spore germinanti, endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo, preventiva, curativa ed antisporulente nei confronti dei funghi della famiglia delle peronosporacee.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE (da vino e da tavola) contro la Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame): impiegare alla dose di 3 - 3,5 kg/ha. Per volumi di irrorazione superiori a 10 hl/ha mantenere la dose di 300 - 350 g/ha.

CUPROFIX®C DISPERSS® può essere applicato per il controllo della peronospora nelle fasi fenologiche comprese tra il germogliamento e la chiusura del grappolo secondo due tipi di calendario: lotta ad intervalli regolari: intervenendo nelle fasi fenologiche critiche distanziando le applicazioni di 8-10 gg; lotta guidata: le applicazioni andranno effettuate secondo un criterio "preventivo" o, quando ciò non sia possibile, secondo un criterio "curativo", intervenendo in questo caso comunque entro 1-2 gg. dalla pioggia infettante. L'applicazione di tale metodo sarà basata sulla disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche in azienda o sulla presenza di servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche.

POMODORO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria impiegare alla dose di 300-350 g/ha;

PATATA contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria impiegare alla dose massima di 300 g/ha;

LATTUGA (pieno campo), SPINACIO, MELONE, ZUCCHINO contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla dose di 300- 350 g/ha;

AGLIO, CIPOLLA contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

PISELLO contro: Peronospora, Antracnosi, Batteriosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

TABACCO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha;

ROSA contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla dose di 300 - 350 g/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per 2/3 della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la dose stabilita di CUPROFIX®C DISPERSS® direttamente nell'acqua, quindi, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione, completare il riempimento del serbatoio con il rimanente quantitativo d'acqua previsto per il trattamento.

COMPATIBILITÀ: CUPROFIX®C DISPERSS® è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare CUPROFIX®C DISPERSS® in associazione con prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA. Si consiglia di effettuare saggi preliminari in caso di impiego su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI LATTUGA, SPINACIO, PISELLO, TABACCO E VITE; 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO, PATATA, AGLIO, CIPOLLA, MELONE E ZUCCHINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente