



Cuprofix® C Disperss®

CUPROFIX® C DISPERSS® è impiegabile per il controllo della peronospora ed altre patologie quali batteriosi ed antracnosi su numerose colture. Va impiegato con criterio preventivo, sfruttando l'azione citotropica del cymoxanil. La presenza del rame da idrossisolfato UPL, peraltro, permette di apportare dosi di principio attivo per ettaro in linea con le più moderne tendenze eco-compatibili.

Composizione:

Rame metallo puro 20%
(da idrossisolfato)
Cymoxanil puro 4%

Formulazione:

Microgranuli idrodispersibili

N° di registrazione:

11637 del 14.03.2003

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

H319 - H361fd - EUH208 - H410 - EUH401

Confezione:

Kg 1 - 10

Intervallo di sicurezza:

3 gg per pomodoro da mensa; 7 gg per zuccino, aglio e cipolla;
10 gg per pomodoro da industria; 14 gg per patata; 28 gg per vite.



Fungicidi

° Marchio registrato UPL

Colture	Avversità	Dose	Note
Vite	Peronospora, Antracnosi	280 - 300 g/hL	Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
Pomodoro (in campo)	Peronospora, Batteriosi	280 - 300 g/hL	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino al 50% di frutti maturi. Numero trattamenti/anno: 6. Intervallo minimo: 7 giorni.
Zuccino (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300 g/hL	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino a quando il 10% dei frutti mostra la tipica colorazione. Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
Patata (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300 g/hL	Impiegare dal primo getto basale fino al 50% di foglie brunastre. Numero trattamenti/anno: 5. Intervallo minimo: 7 giorni.
Aglio, Cipolla (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300 g/hL	Impiegare dallo stadio di 3 - 4 foglie vere fino all'inizio della bulbificazione. Numero trattamenti/anno: 4. Intervallo minimo: 7 giorni.
Rosa (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora sp.</i>)	280 - 300 g/hL	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco principale fino ad inizio fioritura. Numero trattamenti/anno: 3. Intervallo minimo: 7 giorni.