

# PROXANIL SC

SOSPENSIONE CONCENTRATA

FUNGICIDA PREVENTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI PATATA e POMODORO

## PROXANIL SC

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

- Propamocarb cloridrato puro g 36,87 (= 400 g/l)
- Cimoxanil puro g 4,61 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H290: Può essere corrosivo per i metalli. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P234: Conservare soltanto nel contenitore originale. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P280: Indossare guanti, protezione per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313: IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 14808 del 28/10/2011

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:** Arysta LifeScience Benelux SPRL

26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgio- Tel. 003243859711

**Officine di produzione:** Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgio), GI.MA S.r.l., Via Nino Bixio 6 - 44042 Cento (FE); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) - Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia)

**Distribuito da:** Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039/9300304; Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 3359 9422; UPL Italia Srl - Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

**Contenuto netto:** L 1-5-10-20-25

**Partita n.....**

Leggere attentamente prima dell'uso.

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni.



ATTENZIONE

### CARATTERISTICHE

PROXANIL SC è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil (fungicida citotropico). Entrambi le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora del pomodoro e della patata (*Phytophthora infestans*) con meccanismi d'azione diversi e complementari.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega su pomodoro e patata in trattamenti fogliari da iniziare quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni della peronospora (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Le dosi di seguito indicate si riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, assicurarsi che venga mantenuta l'uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.

**PATATA:** Contro Peronospora 2,5 l/ha in 300-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 6 trattamenti ad intervalli di 7 giorni tra un'applicazione e la successiva.

**POMODORO (in campo e in serra):** Contro Peronospora 2,5 l/ha, pari a 250-400 ml/HL, in 600-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni tra un'applicazione e la successiva.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### INTERVALLO DI SICUREZZA

14 GIORNI PER PATATA

3 GIORNI PER POMODORO

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento

Da non vendersi sfuso

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato