

# SACRON 45 WG

## FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI PER USO PROFESSIONALE

### SACRON 45 WG

#### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g	45
- Coformulanti q.b. a	g	100

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 - Nocivo se ingerito. H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 - Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 - Contiene Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P260 - Non respirare la polvere/ gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

#### UPL EUROPE Ltd.

"The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

#### Officine di produzione e confezionamento:

CEREXAGRI BV – Rotterdam (Olanda)

UPL Europe Ltd. – Sandbach (Gran Bretagna)

SBM Formulation Z.I. – Beziers (Francia)

SCAM S.p.A. –Modena

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Ravenna

#### Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)

Registrazione del Ministero Salute N. 12916 del 09/01/2006

Contenuto netto: Kg 0,050/0,100/0,250/0,500/1/5/10



ATTENZIONE

PARTITA N°.....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture trattate prima che siano trascorsi almeno due giorni dall'ultima applicazione.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** il prodotto contiene Cimoxanil (derivato dell'urea).

**Terapia:** Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

**CARATTERISTICHE:** SACRON 45 WG è un fungicida, in granuli idrodispersibili ad alta concentrazione di cymoxanil, caratterizzato da attività citotropiche e translaminari, particolarmente efficace contro le peronosspore della vite, del pomodoro (da mensa e da industria) e della patata. SACRON 45 WG esplica attività preventiva, curativa ed eradicante (potendo controllare infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stato fenologico e di sviluppo delle colture.

È sempre consigliabile applicare SACRON 45 WG in miscela con prodotti di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione.

#### COLTURE AUTORIZZATE

##### VITE (da vino e da tavola)

Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): impiegare 270 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. SACRON 45 WG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere all'inviatura intervenendo con criterio preventivo ed osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni. Numero massimo di trattamenti/anno: 4.

Su uva da vino SACRON 45 WG non ha effetti indesiderati sui processi di vinificazione e non altera le proprietà organolettiche del vino. Impiegare il prodotto in miscele con antiperonosporici di copertura multisito.

##### POMODORO (in campo)

Contro peronospora (*Phytophthora infestans*): impiegare 220 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. SACRON 45 WG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere fino alla maturazione dei frutti, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.

Numero massimo di trattamenti/ciclo colturale: 5. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.

##### PATATA

Contro peronospora (*Phytophthora infestans*): impiegare 270 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. SACRON 45 WG può essere applicato dalla comparsa del primo getto basale laterale fino al 50% di foglie brunastre, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.

Numero massimo di trattamenti/anno: 6. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.

**Preparazione della miscela:** versare SACRON 45 WG direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego. In zone dove l'acqua abbia bassa durezza, si consiglia l'utilizzo di agenti anti-schiumogeni.

**PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:** Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza SACRON 45 WG deve sempre essere impiegato in via preventiva. È inoltre sempre consigliato l'uso in miscela o alternanza con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione, come indicato in etichetta. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

**COMPATIBILITÀ:** SACRON 45 WG è fisicamente compatibile con i prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, maneb, metiram, folpet e con le Poltiglie Bordolessi di origine UPL Europe Ltd., alle concentrazioni d'uso raccomandate. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA

Uva da vino e da tavola: 28 giorni

Pomodoro da industria: 10 giorni

Pomodoro da mensa: 3 giorni

Patata: 7 giorni

**ATTENZIONE**

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

**Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 g**

**SACRON 45 WG**  
**FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA**  
**IN GRANULI IDRODISPERSIBILI PER USO PROFESSIONALE**  
**MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC 27**

**SACRON 45 WG**

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g	45
- Coformulanti q.b. a	g	100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H302 - Nocivo se ingerito. H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 - Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 - Contiene Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P260 - Non respirare la polvere/ gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

**UPL EUROPE Ltd.**

"The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

**Officine di produzione e confezionamento:**

**CEREXAGRI BV** – Rotterdam (Olanda)

**UPL Europe Ltd.** – Sandbach (Gran Bretagna)

**SBM Formulation Z.I.** – Beziers (Francia)

**SCAM S.p.A.** –Modena

**S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Ravenna

**Distribuito da:**

**UPL ITALIA S.r.l.** – S. Carlo di Cesena (FC)

Registrazione del Ministero Salute N. 12916 del 09/01/2006

Contenuto netto: Kg 0,050/0,100

PARTITA N° .....



**ATTENZIONE**

**Caratteristiche e istruzioni per l'uso**

Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**