



KESTREL®

L'Acetamiprid 2.0 *Nuova Generazione*



 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**



www.sumitomo-chem.it



Visita la pagina
del kestrel per
avere maggiori
informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

Insetticida sistemico - Concentrato solubile - MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 4A (IRAC)

Composizione	INDICAZIONI DI PERICOLO	Autorizzazione del Ministero della Salute	CONSIGLI DI PRUDENZA	  ATTENZIONE
Acetamiprid puro 17,6 g (200 g/l) coformulanti q.b. a 100 g	EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso H302 - Nocivo se ingerito. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.	16690 del 07/02/2018	P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P411 - Conservare a temperature non superiori a 40°C. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato in conformità alla regolamentazione nazionale.	

Coltura	Avversità	Dosi ml/hl	N. Trattamenti
 Vite e uva da tavola	Cicalina, Tignoletta	25/45 ml/hl (0,35 - 0,45 l/ha)	1
 Agrumi	Minatrice serpentina	35-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha)	2
	Afidi	25-50 ml/hl (0,35 l/ha)	
	Cocciniglia rossa	50-70 ml/hl (1,5 l/ha)	
 Melo e Pero	Afidi, Tentredini, Minatori fogliari	25-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha)	2
	Carpocapsa	35-50 ml/hl (0,35-0,5 l/ha)	
 Albicocco, Pesco e Nettarino	Afidi, Cicaline	25-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha)	2
	Tripidi, Lepidotteri	35-50 ml/hl (0,35-0,5 l/ha)	
 Susino	Afidi, Lepidotteri	25 ml/hl (0,25 l/ha)	2
 Ciliegio	Afidi, Mosca	15-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha)	2
 Colza	Coleotteri, Afidi	0,25 - 0,3 l/ha	2
 Patata	Afidi, Dorifora	0,15 - 0,2 l/ha	2
 Broccoli, cavolfiori, Cavoli a testa	Afidi, Lepidotteri	0,25 - 0,35 l/ha	1
 Pomodoro, Peperone e Melanzana (pieno campo e serra)	Afidi	0,25 l/ha	2
	Aleurodidi	0,35 - 0,5 l/ha	
 Lattughe, Scarole e altre insalate (NO BABY LEAF)	Afidi	0,25 - 0,35 l/ha	1

INTERVALLI PRIMA DELLA RACCOLTA:

60 giorni per pompelmo, pomelo e arancio, 30 giorni per gli altri agrumi (14 giorni se applicato a max 0,7 l/ha per tutti gli agrumi), 28 giorni per colza, 14 giorni per cavolfiori, broccoli, cavoli a testa, pomacee, albicocco, pesco, nettarino, susino, 7 giorni per vite, lattuga, scarola e altre insalate, patata, peperone, melanzana, pomodoro, 3 giorni per ciliegio e in caso di applicazioni in serra su melanzana e pomodoro.

www.sumitomo-chem.it

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**