

DIABLO SC



Acaricida ovo-larvicida per la lotta contro gli acari fitofagi

Caratteristiche: Il prodotto possiede un'azione traslaminare nelle foglie ed agisce per contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. *Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) e di quelli gialli (es. *Eotetranychus carpini* f. *vitis*).

Composizione: Exitiazox puro 24 g (= 257 g/l)

Miscibilità: Il prodotto non è miscibile con miscele alcaline come Polisolfuri e Calce. Comunque non tutte le miscele sono state testate per cui è consigliabile effettuare saggi preliminari di miscibilità.

Registrazione: N° 15713 del 18-12-2013

Formulazione: SC - Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo CLP ATTENZIONE		Confezioni 0,2 L
Frase H H410, EUH401		
Gruppo IRAC 10A	Marchio registrato Industrias Afrasa S.A.	Titolare registrazione Industrias Afrasa S.A.
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3082	Classificazione ADR 9

Colture (intervallo di sicurezza)

Avversità controllate

Dosi

Modalità d'impiego

Melo, Pero (14 giorni)	Acari	20 ml/hl
Pesco (14 giorni)	Acari	20 ml/hl
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro) (14 giorni)	Acari	20 ml/hl
Vite (14 giorni)	Acari	20 ml/hl
Actinidia (14 giorni)	Acari	20 ml/hl
Fragola (7 giorni)	Acari	20 ml/hl
Cucurbitacee (melone, cetriolo) (7 giorni)	Acari	20 ml/hl
Solanacee (peperone, melanzana, pomodoro) (7 giorni)	Acari	20 ml/hl
Fagiolino (7 giorni)	Acari	20 ml/hl
Soia (34 giorni)	Acari	20 ml/hl
Floreali, ornamentali	Acari	20 ml/hl

È possibile effettuare il trattamento in diversi momenti e precisamente:

- con bassa popolazione di forme mobili: si interviene alla dose di 20 ml/hl;
- con elevata popolazione di forme giovanili e adulte: si interviene alla dose di 20 ml/hl associando un acaricida adalticida.

Indicazioni per il corretto impiego - Dato l'elevato numero di varietà floreali e ornamentali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie. Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia di bagnare abbondantemente la vegetazione con un sufficiente quantitativo di acqua per ettaro.