

# Rizolex<sup>®</sup> GOLD



## Fungicida a lunga persistenza per il controllo della rizottoniosi

**Caratteristiche:** Rizolex Gold è un fungicida organico in grado di controllare gli attacchi di *Rhizoctonia* sp. di lattughe e altre insalate, della patata, delle colture floreali ed ornamentali e di prati e tappeti erbosi.

**Composizione:** Tolclofos Metile 50 g

**Miscibilità:** Il prodotto non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina. Non è comunque raccomandata la miscelazione di Rizolex Gold con altri prodotti fitosanitari.

**Registrazione:** N° 7961 del 22-03-1991

**Formulazione:** WP - Polvere bagnabile

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  <b>ATTENZIONE</b> <b>Frasi H</b> H317, H411, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 kg 
<b>Gruppo FRAC</b> 14	<b>Marchio registrato</b> Sumitomo Chemical Company Tokyo	<b>Titolare registrazione</b> Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3077	<b>Classificazione ADR</b> 9

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Lattughe e altre insalate in serra (28 giorni)	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 kg/ha utilizzando volumi d'acqua di 100-1000 l/ha	Effettuare un trattamento al trapianto. È consentito un solo trattamento per ciclo culturale.
Patata (concia dei tuberi)	<i>Rhizoctonia solani</i>	50 g di prodotto diluiti in 16,5-20 l di acqua per 100 kg di tuberi	Effettuare la concia umida dei tuberi intervenendo prima della semina. È consentito un solo trattamento all'anno.
Floreali	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha	Su floreali che si propagano per via vegetativa (talea, rizoma, bulbo o tubero) intervenire in pre-trapianto lungo il solco di semina/trapianto provvedendo poi all'incorporamento del prodotto al terreno. La dose di impiego è di 32 kg di prodotto per ettaro, distribuiti con 300-600 l di acqua/ha mediante attrezzature montate su trattore o con pompa a spalla. È consentito un solo trattamento per ciclo culturale.
Ornamentali in serra	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha	Intervenire al trapianto effettuando un trattamento al terreno mediante sistemi di fertirrigazione o con irrorazioni con annaffiatoio o pompa a spalla, avendo cura di distribuire il prodotto con volumi d'acqua elevati compresi tra 10 e 100 hl/ha. È consentito un solo trattamento per ciclo culturale.
Prati e tappeti erbosi (campi da golf, impianti sportivi in genere)	<i>Rhizoctonia</i> sp.	32 kg/ha diluiti con 200-400 l/ha di acqua	Effettuare un trattamento al terreno. È consentito un solo trattamento all'anno.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Sulle cultivar poco diffuse o di recente acclimatizzazione si consiglia di effettuare preventive prove parcellari. Non trattare colture sofferenti per gelo, siccità od altre cause abiotiche.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).