

# FRUGON TF

## FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono  
N.A.A. puro g 7 (g/l 77)  
Coformulanti q. b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti. P310 – Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso.

P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.  
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:**

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



**PERICOLO**



**Nufarm Italia Srl -**

Viale Luigi Majno 17/A Milano;  
Sede amm.va Via Guelfa, 5 - Bologna –  
Tel 051 0394022

Stabilimento di produzione:

**Arysta LifeScience Italia GI.MAS.r.l.** - Via IV Novembre n. 19/1-  
Renazzo di Cento (FE)

**SIPCAM INAGRA S.A.** – Sueca, Spagna

**Althaller Italia S.r.l.** – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

**Arysta LifeScience Italia S.r.l.** - Via Paracelso 2, 20864 Agrate  
Brianza (MB)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6092 del  
24/10/1984

CONTENUTO: ml 200, 1L

Riferimento partita N.:

### NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

### MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUGON TF si impiega su **meli** e **peri** per evitare la caduta prematura dei frutti.

La dose d'impiego va da 20 a 40 ml per 100 litri di acqua, intervenendo 10-20 giorni prima della raccolta.

Le dosi basse si usano sulle varietà precoci e quando la temperatura è elevata.

E' consigliabile trattare con cielo coperto o poco prima del tramonto.

**COMPATIBILITA'** – Il prodotto va impiegato da solo.

### INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

**ATTENZIONE** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**