

TIOGEL WG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture

TIPO DI FORMULAZIONE: microgranuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M2

Composizione:

Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
Coadiuvanti q b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280** Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **P362** Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: ---

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L.U

Calle Apolonio Morales 6-8-10 - 28036 Madrid (ES)
+34-91-3598003

Officina di produzione e confezionamento:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos 1301, Maipú - Santiago CHILE (CL)

Distribuito da:

Arysta LifeScience Italia S.r.l.

Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

0,1-0,2-0,5-1-2-5-10-20-25 Kg Partita n.

Registrazione del Ministero della Salute n. 16549 del 29/02/2016

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TIOGEL WG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini, Corineo e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo od alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Dosi (ogni 100 litri di acqua):

Vite - Pomacee - Agrumi - Drupacee - Ortaggi - Fragola - Olivo - Nocciolo - Patata - Girasole - Soia - Tabacco - Floreali e ornamentali - Forestali - Vivai di pino: 250 - 300 per q.le acqua preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi.

Cereali: intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali alla dose di 7 kg per ettaro.

Barbabietola da zucchero: 7 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: uno alla comparsa della malattia ed uno dopo 20 giorni.

Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali e con captano. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di Melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di Pero: Buona Luisa d'Avanches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**


DA NON VENDERSI SFUSO

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: versare TIOGEL WG direttamente nel serbatoio dell'atomizzatore riempiti per 2/3 d'acqua mantenendo in funzione l'agitatore: Portare quindi a volume.




RIEMPIRE PER 2/3
IL SERBATOIO



AZIONARE
L'AGITATORE



VERSARE IL
PRODOTTO



COMPLETARE IL
RIEMPIMENTO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29/02/2016 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24 GEN. 2018