

SUNDEK® SMART CIMICE

Insetticida polivalente a base di Chlorpirifos Metile

Gruppo IRAC B1: Inibitori della acetilcolinesterasi

Tipo di formulazione: sospensione di capsule (CS)

SUNDEK® SMART CIMICE

Autorizzazione Ministero della Salute n° 17589 del 17/04/2020

Composizione

Chlorpirifos-methyl puro g 18,9 % (= 200 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 – Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P333+P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 – Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ascenza Italia S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)

Tel. 02 84944669

Stabilimento di Produzione:

Ascenza Agro S.A., Herdade da Praias 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di etichettatura: STI Solfotecnica Italiana S.p.A - via Matteotti, 16 48121 Ravenna

Taglia: 1, 5, 10, 20 litri

Partita n. vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata, dai corpi idrici superficiali, di 25 metri, di cui 20 metri di fascia vegetata, in combinazione con misure che riducano la deriva del 95%. Intervenire, con un solo trattamento, dopo l'allegagione nella fase di accrescimento dei frutti (diametro > 10 mm) per uso su pomacee e dopo la "scamiciatura" nella fase di accrescimento dei frutti per uso su pesco e nectarino.

Pericoloso per le api; per proteggere le api e altri insetti impollinatori, non applicare su colture al momento della fioritura. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Non utilizzare in presenza di api in attiva alimentazione. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e fino a 14 giorni dopo il trattamento.

Per la protezione degli artropodi utili usare le seguenti misure di mitigazione:

Su pomacee e drupacee: 30 metri di fascia non trattata da zone non coltivate con sistemi che riducano la deriva del 50% oppure una fascia non trattata di 10 metri da zone non coltivate con l'uso di sistemi che riducano la deriva del 95%.

Durante miscelazione, caricamento, applicazione del prodotto utilizzare guanti, tuta da lavoro e dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (FP2, P2 e simili). Effettuare le applicazioni con trattore cabinato. Non applicare con equipaggiamento manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorsi 3 giorni. Per il rientro in campo indossare tuta protettiva che copra corpo, braccia e gambe. Effettuare i trattamenti in modo da evitare che i prodotti raggiungano edifici pubblici e privati. In prossimità di tali aree utilizzare dispositivi che riducano la deriva del 95% e mantenere una fascia di rispetto non trattata di 20 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di primo soccorso. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

SUNDEK® SMART CIMICE è un insetticida contenente la sostanza attiva Chlorpirifos-Metile in sospensione di capsule. Attivo per contatto, inalazione e ingestione è in grado di controllare sia le forme giovanili che adulte. Il prodotto agisce sul sistema nervoso degli insetti interferendo con la normale trasmissione degli impulsi e provocandone la morte.

L'innovativa formulazione in sospensione di capsule (CS) garantisce un rilascio controllato del prodotto e una ridotta emissione di odori.

CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO

Pomacee (Melo, Pero): contro cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) intervenire nella fase di riposo vegetativo (BBCH 00) o a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti e in fase di accrescimento frutti (BBCH 71-79) alla dose di 2,5 litri/ha. Impiegare volumi di acqua non inferiori a 1000 litri/ha al fine di garantire una ottimale bagnatura della vegetazione. Eseguire al massimo una applicazione per ciclo produttivo.

Drupacee (Pesco, Nattarino): contro cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) intervenire nella fase di riposo vegetativo (BBCH 00) o a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti e in fase di accrescimento frutti (BBCH 71-79) alla dose di 2,5 litri/ha. Impiegare volumi di acqua non inferiori a 1000 litri/ha al fine di garantire una ottimale bagnatura della vegetazione. Eseguire al massimo una applicazione per ciclo produttivo.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

INTERVALLO DI SICUREZZA

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 50 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE E 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE DRUPACEE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/04/2020

Con validità dal 17/04/2020 al 15/08/2020

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.