

ERCOLE®



| | |
|------------------|------------------------|
| Composizione | Lambda-cialotrina 0,4% |
| Formulazione | Microgranuli |
| Gruppo | IRAC 3A |
| N. registrazione | 15901 del 01-10-2013 |
| Confezione | 10 Kg |

Geoinsetticida per il controllo di elateridi e diabrotica su mais e di elateridi e insetti terricoli su un ampio numero di colture

CARATTERISTICHE

ERCOLE è un geoinsetticida a base di Lambda-cialotrina. I microgranuli con tecnologia G PLUS garantiscono distribuzione precisa ed attività elevata e duratura sui parassiti terricoli. ERCOLE controlla numerosi insetti terricoli quali elateridi, diabrotica (*Diabrotica virgifera*), nottue, tipule, bibionidi e altri ditteri. Su mais, per il controllo delle larve di diabrotica, può essere impiegato anche successivamente alla semina, fino alla fase della sar-chiatura/rincalzatura.

Il peso specifico di Ercole è 900 g/dm³

TUTELA DELL'AMBIENTE

Il prodotto deve essere completamente interrato nel terreno. rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

| COLTURA | AVVERSITÀ | INDICAZIONI DI IMPIEGO | INT. SIC. GIORNI |
|---|--------------------------------|---|------------------|
| MAIS | Elateridi | 10 - 15 kg/ha Localizzato nel solco di semina 1 trattamento/anno | - |
| | Diabrotica | 12 - 15 kg/ha Localizzato alla semina o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, per un ottimale controllo delle larve 1 trattamento/anno | |
| PATATA | Elateridi ed Insetti terricoli | 10 - 15 kg/ha Localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura 1 trattamento/anno | - |
| SORGO E MIGLIO, SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone), BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, SOIA, COTONE, GIRASOLE, CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo e Zucchini), CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, Anguria e Zucca) | Elateridi ed Insetti terricoli | 10 - 15 kg/ha Localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di trapianto 1 trattamento/anno | - |

| COLTURA | AVVERSITÀ | INDICAZIONI DI IMPIEGO | INT. SIC. GIORNI |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| LATTUGHE E INSALATE (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, Dolcetta, Barbarea, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese brassicacee) SPINACI E SIMILI, CAVOLI AD INFIORESCENZA (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), CAVOLI A TESTA (Cavoli verza, Cavoli cappuccio), ED ALTRI, COLZA, CAROTA, TABACCO, SEMI DI PAPAVERO, FLOREALI ED ORNAMENTALI, VIVAI DI PIANTE ARBOREE | Elateridi ed Insetti terricoli | 10 - 15 kg/ha Localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di trapianto I trattamento/anno | - |

COLTURE PORTASEME

destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme)

| COLTURA | AVVERSITÀ | INDICAZIONI DI IMPIEGO |
|---|--------------------------------|---|
| CAVOLI AD INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CUCURBITACEE, LATTUGHE E SIMILI, MAIS, COLZA, CAROTA, PATATA, SOLANACEE | Elateridi ed Insetti terricoli | 10 - 15 kg/ha Localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di trapianto max I trattamento/anno |