

# HUMINAL COMBI

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA – ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

## COMPOSIZIONE

- Sostanza organica sul tal quale.....11%
- Sostanza organica sulla sostanza secca.....62.5%
- Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica.....62.5%
- Azoto (N) organico sulla sostanza secca.....0,6%

Rapporto C/N: 52

Mezzo estraente: idrossido di potassio

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C

Il prodotto non è combustibile

## GARANZIE

La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull'imballaggio originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell'uso errato o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità delle colture, ai metodi di coltivazione, etc.

## AVVERTENZE

È consigliabile effettuare delle prove di miscibilità su piccole quantità di prodotto e prima dell'uso in campo. Omogenizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. In caso di contatto con il prodotto utilizzare acqua in abbondanza.

## CARATTERISTICHE

Gli acidi umici e fulvici sono molecole organiche, che grazie alla loro natura e struttura, sono capaci di complessare grandi quantità di elementi nutritivi favorendone così l'assorbimento e la traslocazione all'interno dei tessuti vegetali, promuovendo così la divisione e la distensione cellulare.

**Se utilizzati per via radicale**, il loro utilizzo permette di: • migliorare le caratteristiche fisico chimiche del suolo coltivato; • aumentano lo sviluppo dell'apparato radicale delle colture presenti; • aumentano e migliorano l'utilizzazione degli elementi nutritivi presenti nel terreno (potere complessante); • favorisce e stimola la flora microbica.

**Se utilizzati per via fogliare**: • complessano e veicolano i principi attivi e nutritivi con i quali si associano; • stimolano i processi metabolici grazie alla loro azione auxina simile.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

### PER VIA RADICALE

su tutte le colture 5 - 20 kg per ettaro in fertirrigazione

### PER VIA FOGLIARE

su tutte le colture 100 - 300 cc / hl

**ATTENZIONE: EVITARE MISCELE CON RAMATI, ZOLFI E PRODOTTI A REAZIONE ACIDA.**



FABBRICANTE: SPAGRO srl  
P.le Biancamano, 8 - 20121 - MILANO (MI)

**SKL**  
CROPS WELLNESS

☎ 02 62033079 / 335 5287198

🛒 [www.agrimag.it](http://www.agrimag.it) ✉ [info@spagro.it](mailto:info@spagro.it)