



Akselsens
Agenturer A/S

2021

LAMMING



KRITT & EIKEBARK



Støttebehandling ved fordøyelsesbesvær og forgiftninger hos drøvtyggere



Dosering:

Bland pulveret i 18-20 liter lunke vann og tilfør løsningen med SELEKT pumpeverk.

Sammensetning og analytiske innhold

Kalsiumkarbonat	60%
Eikebark	40%
Råprotein	1,4%
Råfett	0,4%
Fiber	12,8%
Aske	62,0%
Kalsium	24,0%



**SELEKT Apetittvekker
"OFF FEED" 785 g / STK**



SELEKT BALANCE 400 g



SELEKT MINI-DRENCHER (sau)



- | | |
|-------|--|
| 85580 | SELEKT KRITT & EIKEBARK 500G /STK |
| 85575 | SELEKT Apetittvekker "OFF FEED" 785 g /STK |
| 85560 | SELEKT BALANCE 400 g |
| 85583 | SELEKT MINI-DRENCHER (sau) |
| 85584 | SELEKT MINI-DRENCHER & PUMPE |

SKJEDEPROLAPS



25320



FLESSASKINNE



SKJEDEBÅND
BÜHNER



FLESSASUTUR



FLESSANÅL I
HÅNDTAK



25322

Flessasutur til bruk ved skjedeprolaps
Kommer i flere størrelser.

Anbefales brukt sammen med skinne.



25340



25350

- 25090 FLESSASUTUR 40 mm / stk.
- 25091 FLESSASUTUR 50 mm / stk.
- 25092 FLESSASUTUR 65 mm / stk.
- 25097 FLESSASKINNE 13 cm / 10 par
- 25094 FLESSANÅL I HÅNDTAK tysk
- 25095 FLESSANÅL SEPARAT tysk
- 25310 FLESSANÅL GJENGET spyd

-
- 25332 SKJEDEBÅND BÜHNER 3 mm x 5 m
 - 25336 SKJEDEBÅND BÜHNER STERIL 80 cm / stk
 - 25320 SKAFTENÅL GERLACH 15 cm (bøyle)
 - 25322 SKAFTENÅL GERLACH 20 cm fin
 - 25325 SKAFTENÅL GERLACH 19 cm
 - 25340 SKAFTENÅL SKJEDEBÅND 23 cm
 - 25345 SKAFTENÅL SKJEDEBÅND 20 cm
 - 25350 SKAFTENÅL SKJEDEBÅND 30 cm

PROLAPSBØYLE



25098 Save-Ewe prolapsbøyle (saue pesar)

REHYDRERING AV LAM

Magesonde til lam for rask tilførsel av råmelk til svake lam. Settet består av en 60 ml sprøyte og sonde.

Husk: Max 50 ml / kg per måltid!

43720 Lammeinn giver 60 ml + sonde


AGRAFFER

Agraffpinsett til påføring av agraffer. Agrafftang til fjerning av agraffer. Brukes bl.a. ved entropion hos lam.



Agraffpinsett

20805	AGRAFFPINSETT 12cm
20800	AGRAFF TANG 12 cm
20823	AGRAFFER 14 x 3 mm
20824	AGRAFFER 16 x 3 mm



Agraffer



Agraff tang

AUTOMATIC SYRINGE

Inject Master

génia
the veterinarian's preference



- Sterilisering: motstandsdyktig mot kokende vann.
- Luer-Lock-nav av plast eller metall.
- Rask, nøyaktig dosejustering ved bruk av «select-a-dose system» (for justerbare modeller).
- Antislip overflate på det fremre håndtaket.
- Ventiler og fjærer laget av rustfritt stål.
- Holdbar plast av overlegen kvalitet.
- Flaskeholder på baksiden for bedre støtte, enkel håndtering og bruk av tunge flasker (for eksempel 250 og 500 ml).
- Ytre skall av plast beskytter flasken mot brudd under håndtering.
- Kompatibel med rengjøringsystemet Stericap® nåler.

- 43086 Injectmaster 1 ml m/ flaskeansats
- 43087 Injectmaster 2 ml m/ flaskeansats
- 43088 Injectmaster 5 ml m/ flaskeansats
- 43089 Injectmaster Flaskeholder 10 - 100 ml (standard)
- 43090 Injectmaster adapter for flaske 10 - 100 ml
- 43091 Injectmaster adapter for flaske 250 - 500 ml

FERROMATIC

Direkte tilslutning til flaske.
Luer lock kobling for kanyle



GLASS
METALL

- 43060 Ferromatic 3 ml m/ flaskeansats
- 43061 PAKNINGSSETT FERROMATIC 3 ml
- 43062 RES. GLASS FERROMATIC 3 ml
- 43065 FERROMATIC 5 ml automatsprøyte m/ flaskeansats
- 43066 PAKNINGSSETT FERROMATIC 5 ml
- 43067 RES.GLASS FERROMATIC 5 ml
- 43068 FERROMATIC FLASKEHOLDER

Elplex

Disse kraftige sprøytene kan brukes på nytt og kan gjenoppbygges. De kan kokes eller autoklaveres for sterilisering.

Med store håndgrep er de også mye enklere å håndtere og bruke



- 43250 ELPLEX 5 ml / stk.
- 43260 ELPLEX 10 ml / stk.
- 43270 ELPLEX 20 ml / stk.
- 43280 ELPLEX 30 ml / stk.

ECO-MATIC

Medisinflasken monteres på sprøytens overside og fyller automatisk ved injeksjon. Sprøyten er laget i kraftig plast og er ergonomisk designet med et robust håndtak.



43075	ECO-MATIC m/ flaskeansats	1 ml
43080	ECO-MATIC m/ flaskeansats	2 ml
43083	ECO-MATIC m/ flaskeansats	0,3 ml
43085	ECO-MATIC m/ flaskeansats	5 ml



SOCOREX

- 43058 Socorex onmbygn.sett slange + lang kanyle
- 43048 Socorex ombygningssett til flaskeholder
- 43059 SOCOREX - FLASKELÅS
- 43057 RES.GLASS SOCOREX 5 ml
- 43044 RES.GLASS SOCOREX 2 ml
- 43052 RES.GLASS SOCOREX 1 ml
- 43047 RES.GLASS SOCOREX 0,5 ml
- 43041 RES.GLASS SOCOREX 0,3 ml m/stempel 6 stk.
- 43056 PAKNINGSSETT SOCOREX 5 ml
- 43043 PAKNINGSSETT SOCOREX 2 ml
- 43051 PAKNINGSSETT SOCOREX 1 ml
- 43042 PAKNINGSSETT SOCOREX 0,5 ml
- 43054 KANYLEFESTE LL SOCOREX
- 43049 DOSESPRØYTE SOCOREX TWIN 2x 0,3 - 2 ml m/sl.
- 43055 DOSESPRØYTE SOCOREX 0,5-5 ml til flaske
- 43053 DOSESPRØYTE SOCOREX 0,3-2 ml til flaske
- 43050 DOSESPRØYTE SOCOREX 0,1-1 ml til flaske
- 43045 DOSESPRØYTE SOCOREX 0,1-1 ml m/slange
- 43040 DOSESPRØYTE SOCOREX 0,1-0,5 ml m/ slange



MERKESTIFT

Fargestifter basert på spesiell voks og parafinolje. Pigmenter av høy kvalitet for å oppnå en utmerket fargekvalitet. Pinnene skilles ut av effektiv skrivemulighet på hud, temperaturstabilitet, fargeintensitet og høy lysstyrke. Ingrediensene er ufarlige for mennesker eller dyr.

- 12750 MERKESTIFT BLÅ RAIDL
- 12751 MERKESTIFT RØD RAIDL
- 12752 MERKESTIFT GRØNN RAIDL



Vetericyn^{VF} +plus



Til AKUTTE OG KRONISKE SÅR

- Brannsår
- Bogsår (gris)
- Munnskurv (småfe)
- Jursår
- Post operative sår
- Hudproblemer som
 - Pyodermier
 - Våteksem
- Verkebyller
- Øyeirritasjoner
(*kun ved intakt hornhinne)

Vetericyn[®]



Vetericyn øyevask
gel 59 ml



Vetericyn spray
500 ml



Vetericyn gel
500 ml



Vetericyn barriergel
90 ml



Vetericyn barriergel
237 ml



Vetericyn spray
90 ml

37108	Vetericyn spray	500 ml / stk.
37105	Vetericyn spray	90 ml / stk.
37111	Vetericyn gel	500 ml / stk.
37117	Vetericyn barriergel	237 ml / stk.
37116	Vetericyn barriergel	90 ml / stk.
37113	Vetericyn øyevask gel	59 ml / stk.



FloryBoost Lamb

Fôrtilskudd til lam og kje

Ved fordøyelsesproblemer



Egenskaper

Inneholder bentonitt

(Montmorillonitt) og essensielle oljer som beskytter tarm slimhinnen.

FloryBoost Lamb inneholder også prebiotika, elektrolytter og energi som bidrar til å opprettholde en balansert tarmflora og god tarmhelse.

Når trenger jeg FloryBoost Lamb?

- For å forebygge diaré som skyldes fôr (fôrbytte)
- Kan brukes sammen med medisinsk
- behandling ved fordøyelsesproblemer

84555 NewBorn FLORYBOOST 100 ml

84556 NewBorn FLORYBOOST 250 ml

Sammensetning

Dekstrose, frukto-oligosakkarider, natrium-klorid, kaliumklorid, magnesiumklorid

Tilsetningsstoffer

Bindemiddel: Bentonitt Smakstilsetning: Essensielle oljer av timian, rosmarin og cajuput

Holdbarhet

1 år i originalemballasjen

Bruksanvisning:

Før dysen bak på lam-mets tunge. Pump en gang (2 ml) og la dyret svelge. Gi en ny dose 6 timer senere

Dosering:

Lam yngre enn 1 måned: En dag. Gjenta andre levedag hvis nødvendig

Lam eldre enn 1 måned: 2 dager. Gjenta tredje levedag hvis nødvendig



Forpakninger:

100 ml pumpedispenser / 6 stk.

250 ml pumpedispenser / 3 stk.

100 ml = 50 doser

250 ml = 125 doser



Boosters for life!

HydraBoost Lamb



Fôrtilskudd til lam og kje

Rehydrering av lam og kje

Egenskaper

HydraBoost Lamb tilfører elektrolytter, osmolytter og sukker til dyret.
HydraBoost Lamb gir et balansert tilskudd av elektrolytter i en tablett

Når trenger jeg HydraBoost Lamb?

- Ved diare`
- Ved tegn til dehydrering
- Hos "sleivelam" (E.colli)
- Før og etter transport
- Ved stress
- Ved varmt vær

84554 NewBorn HYDRABOOST TAB 50 g / 12 stk

84557 NewBorn HYDRABOOST TAB 50 g / 24 stk



Sammensetning

Dektrose, laktose, natriumklorid, natriumbikarbonat kaliumklorid, natriumkarbonat, kalsium-salter av organiske syrer (stearin og palmitinsyre)

Holdbarhet

1 år i originalemballasjen. Brukes innen 3 måneder etter anbrudd, oppbevares kjølig.

Bruksanvisning:

1 tablett løses i en liter vann. Kan brukes både i drikkevann og ved sondeføring. Unngå foring med melk samtidig. Gjenta behandlingen etter 6 - 12 timer i inntil tre dager.

Forpakninger:

12 tabletter

24 tabletter



Boosters for life!

LamBoost



Fôrtilskudd til nyfødte lam og kje
Rik på energi

Egenskaper

LamBoost er utviklet for svake og tynne, nyfødte lam og kje.

LamBoost gir rask tilgjengelig energi, oppkvikkende stoffer (koffein fra planteekstrakter), en blanding av vitaminer og prebiotika. **LamBoost** inneholder næringsstoffer som hjelper svake lam eller kje til å die, slik at de kan dra mest mulig nytte av kolostrumet. **LamBoost** er en pasta som gis i munnen ved hjelp av et trykk på pumpe-dispenseren (vakuumsystemet gjør at flasken kan brukes i alle stillinger)

Når kan jeg bruke **LamBoost**?

- Svake/tynne lam eller kje
- Forlenget lamming
- Adopsjon
- Dårlig miljø (kaldt, vått område)

84550 NewBorn LAMBOOST 100 ml

84551 NewBorn LAMBOOST 250 ml

Sammensetning

Medium kjedede fettsyrer, glukosesirup, plantepulver og sikoriinulin

Tilsetningsstoffer:

Vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12, PP og C

Holdbarhet

1 år i originalemballasjen

Bruksanvisning

LamBoost bør brukes så raskt som mulig etter fødselen.

Før dysen bak på lammets tunge. Pump en gang (2 ml) og la dyret svelge. Gi en dose (2 ml) så snart som mulig etter lamming.

Gi en ny dose 5 timer senere. Gjenta andre levedag hvis nødvendig



Forpakninger:

100 ml pumpedispenser / 6 stk.

250 ml pumpedispenser / 3 stk.

100 ml = 50 doser

250 ml = 125 doser



Boosters for life!

HYPOJET

génia



- | | |
|-------|---|
| 10130 | KANYLE GENALU (MONOJECT) 1,65 x 19 mm 16G |
| 10131 | KANYLE GENALU (MONOJECT) 1,30 x 25 mm 18G |
| 10132 | KANYLE GENALU (MONOJECT) 1,65 x 25 mm 16G |
| 10133 | KANYLE GENALU (MONOJECT) 1,65 x 38 mm 16G |



LAMAID

- et råmelks tilskudd

Inneholder

Et naturlig kolostrumtilskudd med høyt fettinnhold.

Indikasjon

Kan brukes til nyfødte lam som får utilstrekkelig, lite eller ingen råmelk.
Kan også brukes dersom man er usikker på om lammet har fått i seg råmelk.

73190

VETPLUS Lamaid 25g / 20 stk.

Hva kan føre til dårlig råmelksopptak?

- Syk søye
- Mer enn to lam
- Svakfødte lam



Bruksanvisning

LAMAID inneholder 20 porsjonspakninger à 25 g.
En pose blandes i 120 ml varmt vann (ikke kokende).
Blandingen kan gis i flaske eller gjennom sonde,
helst innen 6 timer etter fødsel.

TIPS
Ved trillingfødsler bland
Lamid med søyas egen
råmelk, så alle får alle litt.

VetPlus

A Global Leader in Veterinary Nutraceuticals

100%
DEDICATED
— TO THE —
VETERINARY
PRACTICE

OBIONEKK

PATENTERT

Inneholder flytende kull og tre-eddik fra *Quercus acuta* (Japansk eik) og *Castanopsis cuspidata* (Japansk Chinquapin).

Til støttebehandling ved Cryptosporidose

Kan blandes i melk eller gis med doseringsprøyte.



85080 OBIONEKK 5 L / stk

85084 OBIONEKK Dosepistol / stk



**Ikke glem
Dosepistol**

Dosering:

Ved sykdom/tarmbesvær

Kalv: 60 ml 2 x daglig i 4 dager

Lam/kje: 10 ml 2 x daglig i 4 dager

Forebyggende (fra 3.fôring)

Kalv: 60 ml 1x daglig i 7 dager

Lam/kje: 10 ml 1x daglig i 7 dager

MINERALBOLUS

Mineraltilskudd til drektige sauer er stadig mer i fokus.

- Optimalisere drektighetstilslag
- Optimalisere lammene
- Støtter søyas behov

Hvilke fordeler har mineraltilførsel?

Jod: Viktig tidlig drektighet ved utviklingen av skjoldbruskskjertelen. Det er vitalt at skjoldbruskskjertelen er fullt utviklet slik at lammene får en optimal metabolsk omsetning. Jod er også viktig sent i drektighet for å sikre god vitalitet hos lammene ved fødsel.

Selen: Er en viktig antioksidant og er av betydning for reproduksjon (unnfangelsen, implantering av foster og sædkvalitet). Maternal overførsel av selen er også viktig for lammets utvikling og muskeloppbygging. Selen er en viktig komponent for immunforsvaret, og mangel vil kunne føre til økt risiko for bl.a. jurbetennelse.


Kobolt: Er ikke et depot element, må konstant tilføres. Maternal overførsel av kobolt skjer kun via melk, som igjen viser viktigheten av å gi kobolt til søyer i laktasjon.

Kobber: I jordsmonn kjent for kobbermangel eller i områder med mye kobber-antagonister (som molybden, jern og svovel) er kobbertilførsel nødvendig for utviklingen av lam.

Ikke bruk kobberholdige bolus i raser med kjent sensitivitet (kontinentale raser som Texel) eller i søyer som oppstalles inne over lengre tid.

Fordelene med bolus er

- Sikker forsyning hvert dyr slik at de får dekket sitt behov
- Konstant utskilling av mineraler gjennom hele bolusen sin virketid
- Tidsbesparende når bolusen er lagt ned, er dyret forsørget
- Ingen svinn



**Tildeling 1 bolus per dyr over 40 kg.
Skal legges ned med egen inngiver.**



Agrimin 24-7 SMARTRACE til småfe

Bolusen inneholder jod, selen og kobolt og er anbefalt til søyer gjennom vinteren før lamming. Kan også gis til værer før parringsesongen.

Eroderende teknologi tilfører dyret det daglige behovet av sporstoffer i 180 dager.

- Uten kobber, OK for bruk i kontinentale raser
- Optimaliserer lammings prosenter
- Oppfyller EC Organiske forskrifter til økologisk landbruk
- En 48 g bolus pr. dyr
- Tilgjengelig i pakker à 50 stk.



75283	Agrimin 24-7 SAU START PAKKE 50 dyr
75280	Agrimin 24-7 BOLUS SAU 50 dyr
75284	Agrimin 24-7 SMARTRACE PLUSS Sau (m/ kobber) 50 stk. / 50 dyr
75220	Agrimin INNGIVER Sau (smALL-TRACE, 24-7 og Rumbul)
75222	Agrimin INNGIVER applikatorhode Lam
75221	Agrimin INNGIVER LAM + SAU

Daglig dose over 180
dager fra en 48 g bolus

Kobolt 0.8 mg

Jod 4.0 mg

Selen 0.4 mg

***Kobber (+)** 18.7 mg

Når bruke Agrimin 24-7 SmartTrace?



Agrimin 24-7 SMARTRACE til lam

En bolus tilpasset lam som avgir jod, selen og kobolt. Beregnet for trøvtvgende lam eldre enn 6 uker eller over 25 kg. Er egnet til perioder der jod, selen og kobolttilskudd er viktig for vekst og utvikling av lammet. Dette for å sikre god tilvekst og sterke lam.

Eroderende teknologi tilfører det daglige behovet av sporstoffene i 120 dager.

- Uten kobber - OK for bruk i kontinentale raser
- Optimaliserer tilvekst
- Oppfyller EC Organiske forskrifter til økologisk landbruk
- To 6 g bolus pr. dyr
- Tilgjengelig i pakker til 100 lam



Startpakke



Daglig dose over 180 dager fra en 48 g bolus

Kobolt 0.8 mg

Jod 0.9 mg

Selen 0.2 mg

75282 Agrimin 24-7 LAM START PAKKE 100 dyr

75281 Agrimin 24-7 BOLUS lam 200 stk.



LAMMAC - plastovertrekk til lam

Lammac er polyten overtrekk som gir beskyttelse mot vær og vind for nyfødte lam. Er forebyggende tiltak mot underkjøling av lam, som kan være en utfordring i klimautsatte områder.



75296

Agrimin Lammac STD. klar 100 stk

75297

Agrimin Lammac LARGE orange 100 stk

FORDELER

- Minsker sjansen for underkjøling
- Gir beskyttelse ved ustabilt vær
- Sitter på i 72 timer
- Brytes ned i av UV- lys



Agrimin RUMBUL MAGNESIUM



Til forebyggende behandling av hypomagnesemi hos småfe som beiter på hurtigvoksende gressarter. Rumbul støtter magnesiumstatusen i besetningen i perioder med risiko for gresskrampe. Og i tilfeller med fare for melkefeber. En bolus som består av magnesium kobber og aluminium.

FORDELER

- POM-VPS registrert som forebyggende behandling mot hypomagnesemi hos småfe og kalver.
- Garantert tilførsel av magnesium i risikoperioder.
- Brukes i forkant av lamming for å øke magnesiumopptaket.



75270

Agrimin RUMBUL magnesium sau / kalv 20 stk. / 20 sau / 10 kalv

Rumbul
Magnesium
Småfe

Virkingstid

Inngiving

21 DAGER

1 BOLUS



Ikke den gode gamle "Navledippen"

Super 7+ Navledip tørker ut navlestengen og er en beskyttende oppløsning til nyfødte dyr. Oppløsningen er trygg og effektiv, og er utviklet kun for å tørke ut navlestrengen til nyfødte dyr.

50%
Raskere
tørketid enn
alternativene

- **Hurtigtørking av navlestrengen**
- **Til ALLE nyfødte dyr**
- **Et bedre alternativ enn jod**
- **Uten alkohol**



Super 7+ Navel Dip

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 37118 | NAVLEDIP SUPER 7+ 500 ml |
| 37119 | NAVLEDIP SUPER 7+ 500 ml x 6 stk |

Super
7+
TM

Vetericyn

Førtilskudd til dyr med diare Gis til dyr som har fordøyelsesbesvær, eller ved mistanke om forgiftning.

Dosering:

Voksne kyr: Gi en tube to ganger daglig

Kalver, hest og småfe: Gi 1/3 tube to ganger daglig

OBS! Skal brukes i samråd med veterinær.

Sammensetning:		
Aktivt kull (Carbovet®)		34,0 %
Proylenglykol		10,0 %
Glyserol		20,0 %
Vann		35,8 %
Tilsetninger:		
Xantangummi	E415	0,2 %
Næringsinnhold:		
Råprotein		7,7 %
Råfiber		25,0 %
Olje og råfett		0,5 %
Natrium		0,5 %
Nettovekt:		335 g

Aktivt kull (Carbonvet) til dyr med forgiftningssymptomer og/eller diarree

Forgiftning

Diaree hos storfe

Er forårsaket av

- generelle tarminfeksjoner
- toksisk variant av mastitt (koli-mastitt)
- Vinterdysenteri (forårsaket av Corona virus)
- fordervet fôr / fôr av dårlig kvalitet

Rammer hovedsakelig dyr med høy ytelse eller på slutten av inneførrings-perioden

Behandling av forgiftninger / diaree hos voksne drøvtyggere

Behandlingen avhenger av symptomene, om man ikke kan stille en konkret diagnose.

Væske – og elektrolyttbalansen må korrigeres, og AksVet Ku+ Kull gis for å binde fremmede substanser som bakterie- og myko-toxiner, og for å beskytte slimhinnene i tarmen.

AksVet Ku + Kull støttebehandling:

- Voksne dyr (hest, storfe): 1 tube to ganger daglig inntil normal tilstand oppnås
- Dyr mellom 100 – 400 kg: ½ tube to ganger daglig inntil normal tilstand oppnås
- Dyr under 100 kg: ¼ tube to ganger daglig inntil normal tilstand oppnås



Hvordan bruke AksVet Ku+ Kull:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksjonen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleksjon!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.



AksVet



Ku+ KALVE GEL

Fôrtilskudd med kull og prebiotika til kalver Gis til kalver med fordøyelsesbesvær

Dosering:

Ungdyr/kalver: Gi 2-4 pumpeslag med doseringspistolen (50-100 g), avhengig av størrelse og tilstand til dyret, 2 ganger daglig.
Om nødvendig kan behandlingen fortsette i 2-4 dager eller følg anbefalingen fra din veterinær.

Dosering til lam: 1ml pr. kg. kroppsvekt, 2 ganger daglig i 2-4 dager.

OBS! Skal brukes i samråd med veterinær

Sammensetning:

Kull av eik	30,9 %
Glyserol	3,0 %
Vann	49,9 %
Natriumbikarbonat	5,0 %
Inulin	3,0 %

Tilsetninger:

Xantangummi	E415	0,2 %
-------------	------	-------

Næringsinnhold:

Råprotein	0,9 %
Råfiber	9,3 %
Olje og fett	0,3 %
Væske	49,9 %
Natrium	3,6 %
Kalium	1,5 %
Klorid	4,5 %
Råaske	22,4 %

Nettovekt: 360 g

Aktivt kull, prebiotika og elektrolytter til dyr med forgiftningssymptomer og/eller diarré

Diarré hos unge dyr (kalv / lam)

Årsakene kan være mange

- generelle mage / tarm infeksjoner (virus og bakterier)
- parasitter (koksidier, cryptosporider)
- feilgjæring av melk eller melk i vomma

Rammer særlig dyr, der råmelksopptaket ikke har vært optimalt, eller der hygiene er mangelfull.

Behandling av diarré hos unge dyr (kalv / lam)

Behandlingen baseres på underliggende årsaker. Væske og elektrolytt-tap korrigeres og AksVet Ku+ Kalve gel gis for å binde toksiner og støtte tarmen med næring (prebiotika).

AksVet Ku+ Kalve gel støttebehandling ved diarré

Kalv: 2-4 pumpeslag (50-100 g) gis to ganger daglig.

Lam og kje: 1 ml per kg gis to ganger daglig

Om ingen bedring innen 3-4 dager, ta kontakt med veterinær



Hvordan bruke AksVet Ku+ Kalve gel:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsesrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.



AksVet



Ku+ ENERGI

Førtilskudd med propylenglykol til drøvtyggere Gis til dyr som er i risikogruppen for å utvikle ketose

Dosering:

Voksne kyr: En tube to ganger daglig i 2-4 dager til kyr som står i fare for å utvikle ketose grunnet manglende appetitt. Kan brukes som støttebehandling sammen med medisinsk ketosebehandling.

Småfe: 1/3 tube 2-3 ganger daglig ved manglende appetitt.

OBS! Klinisk ketose skal behandles av veterinær. Skal brukes i samråd med veterinær.

AksVet Ku + Energi

Ketose (også kjent som Husmannsyke og Fat Cow Syndrome) er forbundet med negativ energibalanse, som er en alminnelig tilstand hos melkekyr i de første 2-4 ukene i laktasjon. Risikoen for ketose øker med enhver annen tilstand som reduserer kuas appetitt. Hvis behovet for blodsukker (glukose) ikke dekkes opp, begynner leveren å omdanne andre næringsstoffer – ofte fett- til glukose. Kua tærer da på kroppen. Symptomer på ketose er nedsatt matlyst, vekttap, økt fettmengde i melken tross nedsatt melkemengde og påfallende acetonlukt (ketonstoffer) av melk, urin og luftveier. Pelsen blir tørt og pjuskete, og hodet holdes ofte senket. Noen ketose-kyr utvikler nervøse symptomer som uro, tvangsmessig slikking (på seg selv og innredning) og støyende adferd.

Behandling av ketose

Primærbehandlingen består i å gjenopprette underskuddet av blodsukker i kroppen. Et lett tilgjengelig glukose-tilskudd er derfor nødvendig, enten som glukose intravenøst eller en kombinasjon av propylenglykol og glyserol. Støttebehandling med blodsukkerfremmende stoffer vil sikre en vedvarende tilførsel av glukose. Mange langtidsvirkende hormoner (kortikosteroider) har en glimrende effekt på ketose, men krever samtidig tilstrekkelig lang støttebehandling (2-4 dager).

AksVet Ku+ Energi – bruksområde

Storfe: 1 tube så snart man mistenker ketose, som f.eks. ved tap av appetitt, acetonlukt i melk/urin/ånde. Gjenta behandlingen to ganger i døgnet i 2-4 dager.

Småfe: 1/4 tube to ganger daglig ved risiko for ketose, som ved tap av appetitt og melkefeber i slutten av drektigheten eller like etter lamming.

Sammensetning:	
Propylenglykol	70,0 %
Vann	14,3 %
Tilsetninger:	
Kalsiumpropionat E282	15,0 %
Xantangummi E415	0,7 %
Næringsinnhold:	
Kalsium	3,1 %
Nettovekt:	330 g



Hvordan bruke AksVet Ku+ Energi:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsesrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.



AksVet



Ku+ pH

Førtilskudd til drøvtyggere for å
- regulere pH i vomma
- motvirke sur vom og løpesår

Dosering:

Voksne kyr / okser: En tube to ganger daglig i 2-4 dager.

Ungdyr / kalver: 1/2 tube to ganger daglig i 2-4 dager.

Småfe: 1/2 tube 2-3 ganger daglig i 2-4 dager.

OBS! Ved kliniske symptomer på løpesår, skal veterinær kontaktes. Skal brukes i samråd med veterinær.

Aksvet Ku pluss – pH

Løpesår og Vom-acidose(sur vom)

Vom-acidose, også kalt sur vom, er ikke en sykdom, men et symptom med forskjellige grader av surhet i vomma. Akutt Vom-acidose ses hos kyr som har hatt god tilførsel av kraftfôr. Det kan være en livstruende tilstand, og ved overlevelse, kan dyret utvikle bl.a. leverbyller i etterkant. Subklinisk vom-acidose er et vanlig besetningsproblem som påvirker melkeproduksjonen. Det kan være kun svake symptomer som manglende appetitt, lavt fettinnhold i melken og nedsatt ytelse. Vomsaftprøver vil vise en pH under 5,5.

Behandling av Løpesår og Vom-acidose

Behandlingen av løpesår er rettet mot korrekt fôring og minimering av stress.

Syre-nøytralisering og slimhinnebeskyttelse er påkrevet. Væske- og elektrolyttbehandling kan være nødvendig for å korrigere eventuelle tap. Behandlingen av vom-acidose avhenger av alvorlighetsgraden. Behandling av akutt vom-acidose er i første rekke en kamp om å redde dyrets liv. Tømming av vomma (operasjon eller utsuging av væske) etterfulgt av væskebehandling (i.v og per os) sammen med store mengder bikarbonat er nødvendig.

Behandling av subklinisk vom-acidose er avhengig av årsaken som må identifiseres og korrigeres. Om man får kontroll på den subkliniske vom-acidosen, vil både appetitt og melkeytelse stige igjen.

Sammensetning:		
Natriumkarbonat		45,1 %
Magnesiumtrisilikat		13,7 %
Propylenglykol		10,0 %
Glyserol		5,0 %
Vann		26,0 %
Tilsetninger:		
Xantangummi	E415	0,3 %
Næringsinnhold:		
Natrium		12,3 %
Magnesium		2,3 %
Nettovekt:		430 g



Hvordan bruke AksVet Ku+ pH:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsesrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.

AksVet



Ku+ MAGNESIUM

Fôrtilskudd med magnesium til drøvtyggere Gis til dyr som er i riskogruppen for å utvikle graskrampe

Dosering:

Voksne kyr: En tube to ganger daglig i 4 dager til kyr som står i fare for å utvikle graskrampe eller viser milde symptomer på graskrampe. Som støttebehandling etter intravenøs behandling av klinisk graskrampe, gis en tube daglig i 4 dager.

Småfe: 1/4 tube daglig i inntil 4 dager som støttebehandling etter behandling av klinisk graskrampe.

OBS! Klinisk graskrampe skal behandles av veterinær. Skal brukes i samråd med veterinær.

AksVet Ku + Magnesium

Magnesium tilskudd til storfe og småfe Graskrampe – Hypomagnesemi

- Kan ramme besetninger både senhøst, om vinteren og om våren
- Kan ramme dyr som får friskt, hurtigvoksende, sterkt gjødslet gress
- Forårsaker et kritisk fall av magnesium i blodet som igjen fremkaller kramper
- Kan gjøre dyrene aggressive, så vær forsiktig

Graskrampe – behandling

Rask behandling er nødvendig for et godt resultat. Magnesium, ofte sammen med kalsium gis intravenøst. Dessverre skilles dette raskt ut igjen (4-5 timer). Derfor er per oral behandling med magnesium nødvendig for å unngå tilbakefall.

AksVet Ku + Magnesium bruksområde

Gi en tube 3-5 timer etter intravenøs tilførsel av magnesium

Gi en tube 8-12 timer etter første tube.

Sammensetning:

Magnesiumsulfat hepthydrat	30,0 %
Natriumklorid	1,0 %
Proylenglykol	14,0 %
Vann	26,0 %

Tilsetninger:

Xantangummi E415	0,6 %
------------------	-------

Næringsinnhold:

Magnesium	5,4 %
Natrium	0,4 %
Sulfat	7,2 %

En tube inneholder 21g Magnesium

Nettovekt:

390 g



Hvordan bruke AksVet Ku+ Magnesium:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsesrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.



Fôrtilskudd med propylenglykol og gjær til drøvtyggere Gis til dyr med nedsatt vomfunksjon

Dosering:

Voksne kyr: En tube to ganger daglig i 2-4 dager til kyr med nedsatt vomfunksjon eller manglende appetitt.

Småfe: 1/3 tube 2-3 ganger daglig i 2-4 dager ved nedsatt vomfunksjon, manglende appetitt eller vomatoni.

OBS! Klinisk ketose skal behandles av veterinær.
Skal brukes i samråd med veterinær.

AksVet Ku + Aktiv Vom

Appetittvekker til drøvtyggere med fordøyelsesforstyrrelser

Forstyrrelsene kan deles opp i to grupper:

1. Unormale bevegelser i vommen. Dette kan skyldes fremmedlegme, trommesyke infeksjoner eller skader på nervene som innerverer for-magene.
2. Unormal gjæring i vomma. Dette skyldes problemer med vommas normale mikroflora (bakterier, sopp m.fl.). Hyppige årsaker til dette er dårlig fôrqualität, for stor andel eller ujevn tildeling av kraftfôr i rasjonen, som igjen kan føre til sur vom (akutt eller kronisk) eller vom-råte (basisk vom). Andre sykdommer, som mastitt, metritt og melkefeber kan også påvirke appetitten og føre til stillstand i vomma.

Behandling av fordøyelsesforstyrrelser

Med unntak av fremmedlegme og infeksjoner, er fordøyelsesforstyrrelser som regel et symptom på en fysiologisk ubalanse i vomma. Derfor skal behandlingen av fordøyelsesforstyrrelser rettes mot en oppretting av vommas normale miljø, som vil sørge for normal mikrobiell omsetning av fôret.

Behandlingsprinsipper:

- Sjekke / justere føringen
- korrigere pH i vomma
- korrigere syre/base og elektrolytt (u)balansen
- korrigere vom-innholdet
- Sørge for vitamin- og mineral tilskudd om fordøyelsesforstyrrelsene er kroniske.

Sammensetning:		
Propylenglykol		30,0 %
Vann		26,0 %
Tilsetninger:		
Kalsiumpropionat	E282	35,0 %
Xantangummi	E415	0,3 %
Gentiana pulver		0,6 %
Aktivt Gjær 4B1702		2,7 %
(Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47/ CNCM I-4407/g, 11010 CFU/g)		
Næringsinnhold:		
Råprotein		3,1 %
Råfiber		1,5 %
Råfett		0,1 %
Kalsium		3,1 %
Natrium		0,1 %
Nettovekt:		330 g



Hvordan bruke AksVet Ku+ Aktiv vom:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgereffekten til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgereffeks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost,
oppbevares i romtemperatur.



AksVet



Ku+ KALSIMUM

Førtilskudd med kalsium til drøvtyggere

Gis til dyr som er i risikogruppen for å utvikle melkefeber

Dosering:

Voksne kyr: 2 tuber strategi: Gi en tube rett før eller etter kalving, og den andre tuben 12 timer senere. Om nødvendig, fortsett hver 12 time.

4 tuber strategi: Gi en tube dagen før forventet kalving. Fortsett å gi en tube hver 12. time, hvis nødvendig i 2 dager.

Småfe: 1/3 tube hver 12. time som støtte behandling ved melkefeber eller til dyr som står i fare for å utvikle melkefeber. Gis i inntil 2 dager.

OBS! Klinisk melkefeber skal behandles av veterinær. Skal brukes i samråd med veterinær.

AksVet Ku+ Kalsium

Kalsiumtilskudd til melkekyr ved kalving Melkefeber – Hypokalsemi

Melkefeber rammer særlig eldre kyr (3.gangs kalvere og eldre) og dyr med høyt avdrått. Ved kalving øker kuas behov for kalsium markant, blant annet fordi juret fylles med råmelk.

Kalsium er viktig for muskelfunksjonen. Når kalsiumkonsentrasjonen i blodet er lavt, vil musklene miste kraft og kua vil ha problemer med å komme seg opp. Vomma stopper opp og drøvtygging opphører. Kyr med melkefeber løper også en større risiko for å få andre sykdommer som ketose, tilbakeholdt etterbyrd, børfremfall, mastitt, borbetennelse og løpedreining. xx % av melkekyr får melkefeber, men av større betydning er det at for hver melkefeber-ku det er i en besetning, er det 3-5 subkliniske tilfeller også, som også har behov for ekstra kalsium. Melkefeber har sin pris; tapt ytelse, behandling og eventuelle komplikasjoner. Derfor er forebygging av melkefeber vel så viktig som behandling!

Behandling av melkefeber

Standard behandling er langsom intravenøs tilførsel av kalsium, eventuelt i kombinasjon med magnesium. Denne infusjonen får som regel kua på beina igjen i løpet av kort tid.

Tilførsel av kalsium oralt som støtte terapi er meget viktig.

Om dette uteblir, er det 30-40% som får tilbakefall og som da trenger en ny behandling.

Gir man derimot kalsium oralt to ganger i etterkant av infusjonen, reduseres dette til 5 %.

Valg av kalsiumsalt er også viktig. Kalsiumklorid tas opp svært hurtig fra mage/tarmkanalen, men kan virke etsende om den blir liggende i munn /spiserøret. Det er derfor viktig at kua har svelgerefleks ved inngivelse av kalsium oralt. Kalsiumpropionat har et forlenget optak gitt oralt, og det tilfører dessuten energi i tillegg. AksVet Ku + Kalsium inneholder 55 g rent kalsium, både som kalsiumklorid og kalsiumpropionat.

AksVet Ku+ Kalsium som støttebehandling ved melkefeber

Sammensetning:

Kalsiumklorid	36,9 %
Propylenglykol	3,7 %
Glyserol	4,6 %
Vann	34,1 %
Melasse	1,8 %

Tilsetninger:

Kalsiumpropionat	18,5 %
Xantangummi	0,4 %

Næringsinnhold:

Kalsium	14,1 %
Råprotein	0,2 %
En tube inneholder 55 g kalsium.	

Nettovekt: 390 g



Hvordan bruke AksVet Ku+ Kalsium:

- Klipp av tuppen på tuben og skru fast forlengelsrøret som følger med
- Legg tuben i doseringspistolen
- Ta tak i munnviken på dyret med din ledige hånd
- Før dosepistolen inn i munnen, slik at håndtaket er på høyde med fortennene.
- Tøm tuben i takt med svelgerefleksen til dyret*
- Vask doseringspistolen godt etter bruk

* Gis kun til dyr med normal svelgerefleks!

Produsent: FinnCow, Örninkatu 15, 24100 Salo, Finland
Oppbevares utilgjengelig for barn. Tåler ikke frost, oppbevares i romtemperatur.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Ravnsborgveien 31
1395 Hvalstad

Telefon: 66 98 60 40
post@aksvet.no