

HERBICIDE TOURNESOL DE POST ÉMERGENCE

ÊTRE À LA POINTE DES ÉVOLUTIONS



Express[®] SX[®]
Herbicide

BONNE PRATIQUE DE DÉSHÉRBAGE AVEC EXPRESS® SX® HERBICIDE






AU MOMENT DU SEMIS :

- Choisir une variété de tournesol tolérante à l'herbicide Express® SX® adaptée à la situation agronomique de la parcelle et à l'historique de salissement en adventice non maîtrisée (exemple chardon des champs).
- Réaliser le semis dans des conditions optimales.
- Identifier la parcelle à l'aide d'un jalon pour éviter toute confusion lors des traitements herbicides.

APRÈS LA LEVÉE DU TOURNESOL :

- Planifier la (ou les) intervention(s) avec Express® SX® entre les stades 2 feuilles et jusqu'au stade 8 feuilles de la culture.
- Ajuster la (ou les) interventions avec Express® SX® en fonction de la flore réellement présente sur les parcelles : la bonne dose au bon moment.
- Respecter les modalités d'emploi de l'Express® SX® figurant sur l'étiquette et dans les pages intérieures de ce document.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

BBCH		 2 - 4 feuilles	 4 - 6 feuilles	 6 - 8 feuilles
Flore dicotylédones sans graminées (hors ambroisie à feuille d'armoise)	Cas général	Express® SX® herbicide 45 g/ha + Trend® 90 adjuvant 0,25 l/ha		
	En situation à risque de levées échelonnées	Express® SX® herbicide 25 g/ha + Trend® 90 adjuvant 0,25 l/ha	Express® SX® herbicide 20 g/ha + Trend® 90 adjuvant 0,25 l/ha	
En présence d'ambroisie à feuille d'armoise	En situation à risque de levées échelonnées	Express® SX® herbicide 30 g/ha + Trend® 90 adjuvant 0,15 l/ha	Express® SX® herbicide 30 g/ha + Trend® 90 adjuvant 0,15 l/ha	

Pour maîtriser les levées échelonnées des adventices, il peut être nécessaire de fractionner en 2 applications l'herbicide Express® SX® avec un minimum de 7 jours entre les 2 applications. Dans les situations d'utilisation d'un herbicide anti-graminées foliaire en post émergence du tournesol, il est nécessaire de respecter 7 jours minimum entre l'application de l'anti-graminées et l'application de Express® SX® herbicide.

AFIN D'ASSURER LA DURABILITÉ DES HERBICIDES, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER EXPRESS® SX® HERBICIDE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME EN INCLUANT UN PROGRAMME DE PRÉLEVÉE.

SOUPLESSE DU DÉSHÉRBAGE

- Large fenêtre d'application de Express® SX® herbicide entre 2 et 8 feuilles des tournesols, pour un traitement des adventices au stade optimal.
- Fractionnement possible de la dose homologuée pour une meilleure gestion des levées échelonnées.
- Utilisation de "la bonne dose au bon moment" pour un désherbage raisonné.
- Technologie SX® de formulation de l'herbicide pour un nettoyage du pulvérisateur simplifié et une plus grande sécurité pour les tournesols conventionnels ou les autres cultures traitées ensuite.

Express® SX®

Herbicide

EXPRESS® SX® HERBICIDE EN RÉSUMÉ

N° AMM	2090052	NBRE D'APPLI	1 à 2 traitements par hectares et par an
COMPOSITION	50% de tribénuron-méthyle	CLASSEMENT	H317 - H410 - H373
FORMULATION	Granulés solubles dans l'eau (SG)	DRE	48 heures
USAGES ET DOSES AUTORISÉS	Tournesol (variétés tolérantes à l'herbicide Express® SX®) - Dicotylédones annuelles et vivaces : 45 g/ha ⁽¹⁾ + Trend 90	ZNT	5 mètres
STADE	2 feuilles (BBCH 12) à 8 feuilles (BBCH 18) du tournesol	DAR	BBCH18
		PACKAGING	Pack Express® SX® Herbicide 90g + Trend® 90 adjuvant 0,5l

⁽¹⁾ En présence d'ambrosie à feuille d'armoise : 60 g/ha


PRÉVENTION DE LA RÉSISTANCE AUX HERBICIDES

Les recommandations de bonnes pratiques sont basées sur la pratique habituelle recommandée par le Comité mondial d'action contre la résistance aux herbicides (HRAC). Les Bonnes Pratiques Agricoles doivent permettre de maîtriser les adventices dans les cultures et dans la rotation. Il est conseillé de recourir à des modes alternatifs de lutte contre les adventices et d'utiliser d'autres modes d'action en séquence ou en mélanges.

GROUP	B (2)	HERBICIDE
-------	-------	-----------

FMC ENCOURAGE L'UTILISATION DE MÉTHODES DE LUTTE INTÉGRÉE POUR LA PROTECTION DES CULTURES QUI COMPRENNENT :

1. Des méthodes agronomiques afin de limiter les populations d'adventices
2. Des observations au champ et toute méthode de caractérisation permettant :
 - une identification précise de l'adventice
 - un suivi des populations
3. Une alternance et/ou association de modes d'action différents et efficaces sur l'adventice ciblée
4. Un déclenchement raisonné des applications en fonction de l'adventice ciblée et de son seuil de nuisibilité



LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ

-  N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.
-  Protégez votre santé et celle de votre entourage.
-  Surveillez les conditions météorologiques.
-  Protégez les points d'eau.
-  Protégez les pollinisateurs.
-  Préservez la faune sauvage.

 D'INFOS SUR WWW.MON-PHYTO-PRACTIQUE.FR : FLASHEZ-MOI



Retrouvez nous sur YouTube



Express® SX® : Granulés solubles dans l'eau [SG] à base de 500 g/kg (50 % p/p) de tribénuron-méthyle. A.M.M. n° 2090052. EUH401–Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. SX est une marque déposée de FMC Corporation ou l'une de ses filiales. Homologué et distribué par Cheminova Agro France SAS - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - France - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - www.fmcagro.fr. Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. Crédits photos : Shutterstock - 05/22



ATTENTION - H317-Peut provoquer une allergie cutanée. H373–Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

UN HAUT NIVEAU D'EFFICACITÉ SUR UNE LARGE FLORE

Des résultats sans précédent sur flore "difficile"

Cotylédons à 2 feuilles	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Ambroisie à feuille d'armoise*	
Ammi élevé	
Bident tripartite	
Datura stramoine	
Xanthium (ou lampourde)	

Un contrôle efficace des impasses techniques actuelles

Stade adapté à l'adventice	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Chardon des champs	
Liseron des haie	
Tournesol sauvage	

* Express® SX® 60 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha

Une solution de désherbage puissante, flexible et fiable sur une large flore "classique"

1 - Dicotylédones annuelles

Cotylédons à 2 feuilles	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Amarante blite	
Amarante réfléchie	
Capselle	
Chénopode blanc	
Chénopode puant	
Coquelicot	
Laiteron rude	
Matricaire camomille	
Matricaire maritime	
Matricaire annuelle	
Morelle noir	

Cotylédons à 2 feuilles	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Pensée	
Ravenelle	
Renouée liseron	
Renouée des oiseaux	
Renouée persicaire	
Réséda fausse-raiponce	
Repousses de colza	
Sanve	
Séneçon	
Stellaire	
Véronique de Perse	

2 - Dicotylédones vivaces

Stade adapté à l'adventice	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Armoise	
Laiteron des champs	
Ortie brûlante	

Stade adapté à l'adventice	Express® SX® 45 g/ha + Trend® 90 0,25 l/ha
Rumex	
Tussilage	

Très sensible > 95 % 85 % < Sensible < 95 %

MAÎTRISE DES FLORES DIFFICILES

Express® SX® herbicide permet de maîtriser des adventices problématiques comme l'ambroisie à feuilles d'armoise, le xanthium ou le chardon des champs



AMBROISIE À FEUILLES D'ARMOISE




XANTHIUM



CHARDON DES CHAMPS

LARGE CHOIX DE VARIÉTÉS SÉLECTIVES ET APPROUVÉES POUR L'HERBICIDE EXPRESS® SX®*



* Consulter votre interlocuteur local pour plus d'informations