



Optima 50 C Plasma

Ergänzungsfuttermittel für Ferkel (Krümel)



Zusammensetzung :

Hafer, entspelzt, extrudiert - Weizen - Sojabohnen, dampferhitzt - Molkenpulver - Weizen, extrudiert - Weizenkleie - 5,00% Blutplasma pulver, von Schweinen - Sojaextraktionsschrot aus geschälter Saat, dampferhitzt, extrudiert - Zichorienpflanze, getrocknet - Mais, extrudiert - Pflanzenöl (Sonnenblumen) - Weizenprotein - Milchsüßholzwurzel - Pflanzenöl, raffiniert (Kokos, Palm) - Monocalciumphosphat - Kartoffeleiweiß - Sojaextraktionsschrot aus geschälter Saat, dampferhitzt - Lachsöl - Natriumchlorid - Natriumbicarbonat - Calciumcarbonat - Monocalciumphosphat - Zucker - Kokoskuchen hydrolysiert - Fermentierter Roggen - Salze von Fettsäuren (Buttersäure) - Mittelkettige Fettsäuren, mit Glycerin verestert - Bierhefe, getrocknet - Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Rosmarinus officinalis, Caesalpinia spinosa, Curcuma longa und Sophora japonica - Kokos- und Palmkernfettsäuren - Glucose - Calcium-Magnesiumcarbonat

Enthält Blutprodukte - Darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden

Inhaltsstoffe :

24,0 % Rohprotein - 10,5 % Rohfett - 7,5 % Rohasche - 2,5 % Rohfaser - 2,5 % Lysin - 0,8 % Methionin - 1,5 % Threonin - 0,5 % Tryptophan - 1,2 % Calcium - 0,8 % Phosphor - 3,8 % Stickstoff - 0,5 % Natrium - 0,2 % Magnesium - 15,0 MJ/kg ME

Zusatzstoffe :

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe :

30000 IE/kg Vitamin A (3a672a) - 4000 IE/kg Vitamin D3 (3a671) - 200 IE/kg Vitamin E (3a700) - 4 mg/kg Vitamin K3 (3a711) - 4 mg/kg Vitamin B1 (3a821) - 13 mg/kg Vitamin B2 (Riboflavin) (3a825) - 6 mg/kg Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) (3a831) - 80 mcg/kg Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 100 mg/kg Niacinamid (3a315) - 30 mg/kg Calcium-D-Pantothenat (3a841) - 2 mg/kg Folsäure (3a316) - 300 mcg/kg Biotin (3a880) - 100 mg/kg Vitamin C (3a312) - 300 mg/kg Betainhydrochlorid (3a925) - 5 mg/kg Jod als Kaliumjodid (3b201) - 0,8 mg/kg Selen als Natriumselenit (3b801) - 140 mg/kg Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) - 140 mg/kg Kupfer als Kupfer-(II)-Protein-Hydrolysat - chelat (3b407) - 100 mg/kg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502) - 210 mg/kg Zink als Zinkoxid (3b603) - 250 mg/kg Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (3b103)

Zootechnische Zusatzstoffe :

2800 FTU/kg 3-Fytase EC 3.1.3.8 (4a1600) - 304 U/kg Endo-1,3(4)- β -glucanase EC 3.2.1.6 (4a15) - 2440 U/kg Endo-1,4- β -xylofuranase EC 3.2.1.8 (4a15) - 2600 10^6 KBE/kg Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (im Verhältnis 1:1) (4b1700i) - 4000 10^6 KBE/kg Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 (4d1703)

Technologische Zusatzstoffe :

3,43 mg/kg Butylhydroxyanisol (1b320) - 283 mg/kg Butylhydroxytoluol (BHT) (E321) - 15 mg/kg Propylgallat (E310) - 4097 mg/kg Sepiolit (E562) - Calciumformiat (E238) - Zitronensäure (E330) - Sorbinsäure (E200) - Ameisensäure (E236)

Sensorische Zusatzstoffe :

811 mg/kg Mischung aus Aromastoffen - 294 mg/kg Natriumsaccharin (E954 (iii)) - 0,06 mg/kg Neohesperidin-Dihydrochalcon (2b959) - 82,67 mg/kg Benzoesäure (2b08021)

Nettomasse :

25 kg

Fütterungshinweis: Dieses Ergänzungsfuttermittel darf an Ferkel bis zu vier Wochen nach dem Absetzen wegen der gegenüber Alleinfuttermittel höheren Gehalte an Vitamin A, D3 und Spurenelementen bis zu 50 % der Tagesration verfüttert werden. Aus diätetischen Gründen ist der Calcium- und Phosphorgehalt abgesenkt.

Empfohlene Einsatzrate: 50 % im Endfutter

Der Zusatzstoff (4b1700i) wird an laktierende Sauen und Saugferkel gleichzeitig verfüttert.

Dieses Futter enthält den Zusatz Selko AO-mix, bestehend aus diversen Kräutern (u.a. Rosmarin und Curcuma) mit einer starken antioxidativen Wirkung.

Mindesthaltbarkeitsdauer setzt kühle, trockene und hygienische Lagerung voraus. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

Zulassungsnummer : alpha-BE2041 QS-ID : 4031735222180

421

Trouw Nutrition Deutschland GmbH

86666 Burgheim Gempfinger Str. 15 Telefon 08432 / 89-0

pastus* AMA-Gütesiegel tauglich

Optima 50 C Plasma