

Mais - Herbizidlösungen mit guter Bodenwirkung gegen Hirsen

Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatzterm in	Unkräuter										Ungräser							Hirsedauerwirkung	Unkrautdauerwirkung	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughäfer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke		

TBA-frei, Sulfonylharnstoff-haltig

Arigo Spectrum Plus-Pack	250 g + 0,25 l + 2,5 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250	BBCH 12-16	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; B; O + K; K
IP Mais Duo 2.0 (Spectrum + IP Elumis)	1,0 l + 1,25 l	Dimethenamid-P 720 + Mesotrione 75; Nicosulfuron 30	BBCH 12-16	◐	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	K + F; B

TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-haltig

Arigo + FHS + Gardo Gold	250-300 g + 0,25-0,3 l + 2,5 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + S-Metolachlor 313; Terbutylazin ¹⁾ 188	BBCH 12-18	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; B; O + K; C
Elumis Gold Pack (Gardo Gold + Elumis)	2,5 l + 1,25 l	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Terbutylazin ¹⁾ 188; S-Metolachlor 313	BBCH 12-18	●	●	◐	◐	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	◐	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; F + C; K

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

¹⁾ **Terbutylazin:** In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbutylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbutylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.

Mais - Herbizidlösungen, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser

Produkt/Lösung	Aufwandmenge /ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz- termin BBCH	Unkräuter										Ungräser							Hirsedauerleistung	Bodenwirkung Unkräuter	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughäfer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke		

TBA-frei

Arigo + FHS + Peak + IP Pendi 400 SC	300 g + 0,3 l + 12 g + 2,0 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Prosulfuron 750 + Pendimethalin 400	BBCH 12-13	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; B; F + B; K
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	1,25 l + 20 g	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Prosulfuron 750	BBCH 12-17	●	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; F + B

TBA-haltig mit Teil-Bodenwirkung gegen Unkräuter

Arigo + FHS + Zeagran ultimate ¹⁾	300 g + 0,3 l + 1,25 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Terbutylazin ²⁾ 250; Bromoxynil 100	BBCH 12-16	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	B; B; F + C;C
Gardo Gold + Nicogan + Peak	2,0 l + 1,0 l + 16 g	Terbutylazin ²⁾ 188; S-Metolachlor 313 + Nicosulfuron 40 + Prosulfuron 750	BBCH 12-17	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	C; K + B; B

¹⁾ Aufbrauch spätestens 17.09.2021
Quelle: BavWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

²⁾ **Terbutylazin:** In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbutylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbutylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.