

PROPLANT®

DAS SYSTEMISCHE FUNGIZID ZUM SCHUTZ GEGEN
PILZKRANKHEITEN IN GEMÜSE UND ZIERPFLANZEN.
PROPAMOCARB-HCl 722 g/l [SL]



F U N G I Z I D

SICHER DURCH BODEN- UND BLATT- WIRKUNG

- Ausgezeichnete Wirksamkeit gegen Oomyceten-Pilze wie *Phytophthora spp.* und *Pythium spp.*
- Ideal für die Jungpflanzenanzucht dank lang anhaltender Wirkungsdauer
- Stark stimulierende Wirkung, für verstärkte Ausbildung von Wurzeln und Blüten
- Sehr kulturverträglich

Beratungshotline 02232-701 25 55

www.upl-ltd.com/de
beratung-de@upl-ltd.com



PROPLANT®

PROPLANT® ist ein systemisches Fungizid für den Einsatz gegen Oomyceten-Pilze wie *Pythium spp.* und *Phytophthora spp.*, welche unter anderem die Umfallkrankheit (damping-off), Wurzel- und Stiefäule und Falschen Mehltau verursachen. PROPLANT® schützt nach Applikation die keimenden Setzlinge effektiv vor Infektionen.



WIRKSTOFF	722 g/l Propamocarb-Hydrochlorid (66,9 Gew. - %)
FORMULIERUNG	Wasserlösliches Konzentrat [SL]
WIRKSTOFFAUFNAHME	systemisch
WIRKMECHANISMUS	Der Wirkstoff Propamocarb hemmt die Synthese von Phospholipiden und Fettsäuren, die der Schadpilz zum Aufbau von Zellwänden benötigt. Er stört und behindert damit das Myzelwachstum, die Sporenproduktion und die Keimung.
KULTUREN	Kohlgemüse, Fruchtgemüse, Blattgemüse, frische Kräuter, Salate, Zucchini, Tulipa-Arten, Zierpflanzen
PACKUNGSGRÖSSEN	12 x 1 l; 4 x 5 l

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

KULTUR	KRANKHEIT	AWM	ANZAHL DER BEHANDLUNGEN	ANWENDUNGSTERMIN	INTERVALL (TAGE)
Salate (Freiland)	Falscher Mehltau (<i>Bremia lactucae</i>)	1,5 l/ha (in 1.000 l Wasser) spritzen	3	Bei Infektionsgefahr	10
Kohlgemüse, Fruchtgemüse, Frische Kräuter, Blattgemüse (Jungpflanzenanzucht im Gewächshaus)	Pythium- und Phytophthora-Arten	5 ml/m ² (in 3 l Wasser/m ²) gießen	2	Bei Infektionsgefahr	7-21
Zucchini (Gewächshaus)	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3,0 l/ha (in 600 l Wasser) spritzen	3	Bei Infektionsgefahr	7-10
Tulipa-Arten (Gewächshaus)	Pythium- und Phytophthora-Arten	0,3 % im Tauchverfahren	1	Unmittelbar vor dem Strecken	-
Zierpflanzen ausgenommen Tulipa-Arten (Gießverfahren; Gewächshaus)	Pythium- und Phytophthora-Arten	5 ml/m ² (in 3 l Wasser/m ²) gießen	Max. 2 bzw. 3 pro Kultur und Jahr	Bei Infektionsgefahr nach der Saat, dem Strecken oder Pikieren	-
Zierpflanzen ausgenommen Tulipa-Arten (Tauchverfahren; Gewächshaus)	Pythium- und Phytophthora-Arten	0,3 % im Tauchverfahren	Max. 1 bzw. 3 pro Kultur und Jahr	Bei Infektionsgefahr	-



UPL Deutschland GmbH
Kölustraße 107-109
50321 Brühl
beratung-de@upl-ltd.com
www.upl-ltd.com/de