

NEU

KARAT

GESCHLIFFENE PHOMA- UND CYLINDRO-RESISTENZ.

ERTRAG	Kornertrag		9	
	Ölertrag		9	
	Ölgehalt		8	
GESUNDHEIT		durchschnittlich	hoch	
	Phoma			
	Cylindrosporium			
	Verticillium			
	TuYV			
Bedachter WR-Einsatz im Frühjahr bei sehr früher, üppiger Entwicklung.				
STANDORT		mittel	gut geeignet	
	Leichte Standorte (z. B. Sand, lehmiger Sand)			
	Gute Standorte (z. B. Löss & V, Lehm, Hügelland)			
	Schwierige Standorte (z. B. Marschen, Höhenlagen, Ton)			
ANBAU UND ERNTE	Saattermin	früh		spät
	Herbstentwicklung	verhalten		wüchsig
	Wachstumsstart Frühjahr	früh		spät
	Winterhärte	gering		hoch
	Standfestigkeit	gering		hoch
	Druschtermin	früh		spät
	Druschkraftbedarf	gering		hoch

- Neuer Phomablocker aus RlmS & Rlm12^{NEU}.
- Neu mit Cylindrosporium-Resistenz (LLS-A).
- Längerer Robusttyp mit guter Stängelreife.

