

# Milki<sup>®</sup> vital



## Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber

**Zusammensetzung:** Flohsamenschalen; Molkenpulver; Fructose; Bierhefe; Guarkernmehl; Magermilchpulver; Molkeneiweißpulver; Reisquellmehl; Natriumchlorid; Magnesiumfumarat, Monokaliumphosphat

**Inhaltsstoffe:** 10,4 % Rohprotein; 1,7 % Rohfett; 1,7 % Rohfaser; 9,3 % Rohasche; 0,4 % Calcium; 0,4 % Phosphor; 1,2 % Natrium; 0,14 % Magnesium

**Zusatzstoffe je kg:** **Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:** 160 000 I.E. Vitamin A (3a672a); 10 000 I.E. Vitamin D 3 (3a671); 2 000 mg Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) (3a700); 32 mg Kupfer als Glycin-Kupferchelate, Hydrat (3b413); 300 mg Zink als Zinkoxid (3b603); 380 mg Zink als Glycin-Zinkchelate, Hydrat (3b607); 552 mg Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) **Zootechnische Zusatzstoffe:** 85 Mrd. KBE Enterococcus faecium NCIMB 11181 (4b1708) **Technologische Zusatzstoffe:** Zitronensäure (E 330); Fumarsäure (1a297); Calciumpropionat (E 282); Calciumformiat (E 238); Kaliumsorbat (E 202); 19 500 mg Natrolith-Phonolith (E 566) **Sensorische Zusatzstoffe:** 1 000 mg Trockentraubenextrakt(2b485)\*

**Nettomasse: 10 kg**

**Fütterungshinweis:** Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitamin A, D und Spurenelementen nur an Kälber bis zu 50 g je Tier und Tag verfüttert werden.

\* Milki vital enthält AO-Mix, bestehend aus standardisiertem Traubenextrakt reich an Polyphenolen mit starker antioxidativer Wirkung.

**Hinweis:** Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische, kühle und trockene Lagerung. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

**Zulassungsnummer:** DE-BY-1-00008

2619

**Trouw Nutrition Deutschland GmbH 86666 Burgheim Gempfinger Str. 15 xTelefon 0 84 32 / 89-0**

Seit Jahren beweist Milki vital, unter hohem Keimdruck, erfolgreich seinen großen Wert in der Praxis. Bei Betrieben mit hohem Kälberanfall in kurzer Zeit wird dieser Problembereich verstärkt beobachtet.

### Dosierung / Fütterungshinweis:

#### Allgemeiner Einsatz:

1 – 2 Messlöffel **Milki vital** (10 – 20 g) für 1 – 2 Wochen über die Milchtränke verabreichen.

#### Milchersatz bei hohem Keimdruck für 1 – 2 Mahlzeiten:

3 Liter **Milkilyt-Tränke** (= 1 voller Messbecher mit 150 g **Milkilyt** auf 3 Liter Wasser) dreimal täglich verabreichen

plus

1 - 2 Messlöffel **Milki vital** pro 3 Liter **Milkilyt-Tränke**

**pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich  
VLOG geprüft**

Stoffstrombilanzangaben: 0,92 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 1,66 % Stickstoff