

**Spezialkonzentrat zur Eigenherstellung
hochwertiger Ferkelfutter
- Pre-Starter – Absetzmischungen – Aufzuchtfutter -**

Milkiwean VarioMix

Leistungsstark und ferkelgerecht



Mit dem Spezialkonzentrat Milkiwean VarioMix lassen sich - bei variabler Einsatzrate (10 – 40 %) – zusammen mit dem betriebseigenen Getreide hochverdauliche und schmackhafte Ferkelmischungen herstellen.

Milkiwean VarioMix

- liefert für Saug- und Absetzferkel unverzichtbare Komponenten (*u. a. aufgeschlossener Mais, Milchprodukte, extrudierte Sojaprodukte, Reiskleber, Kartoffeleiweiß, Zucker, hochverdauliche essentielle Aminosäuren, Säurekombination*).
- ermöglicht „fließende“ und störungsfreie **Übergänge** auf das Anschlussfutter.
- ist einfach in der Anwendung und bietet ein **hohes Maß an Flexibilität** bei der Rationsgestaltung (*s. Rückseite!*).
- bewirkt eine **stabile Darmflora** und optimale Verdauung für maximale Leistung.
- verbessert die **Schmackhaftigkeit** des Futters und erhöht die Aufnahme.
- ausgezeichnete Fließeigenschaften durch **Krümelstruktur**.



überreicht durch:

Trouw Nutrition Deutschland GmbH
86664 Burgheim · Telefon 0 84 32 / 89-0
www.milkivit.de - milkivit@nutreco.com

Mit Milkiwean VarioMix gestalten Sie die Ferkelaufzucht einfach und erfolgreich!

Ferkelmischungen mit Milkiwean VarioMix erfüllen höchste Leistungsansprüche und ermöglichen individuelle Fütterungskonzepte !

**Mischungsbeispiele für die unterschiedlichen Leistungsphasen
(für den Gewichtsbereich von ca. 6 – 18 kg Lebendmasse)**

	1 Pre- Starter	2 Pre Starter	3 Absetz- starter	4 Absetz- starter	5 FAZ I	6 FAZ I
Zusammensetzung:						
Milkiwean VarioMix, (%)	40,0	40,0	30,0	30,0	15,0	10,0
Troumix Ferkel Novamin, (%)	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0
Selacid GG Liquid, (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gerste, (%)	35,0	36,6	40,0	40,0	40,0	40,0
Mais, (%)	10,0		10,0			
Weizen, (%)	9,6	18,0	10,6	20,6	28,1	31,1
Sojaextr.-schrot (47 % RP), (%)			4,0	4,0	11,0	13,0
Pflanzenöl, (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Inhaltsstoffe:						
ME – Schwein, MJ / kg	14,40	14,40	14,10	14,10	13,70	13,60
Rohprotein, %	17,00	17,20	16,90	17,10	17,40	17,40
Rohfaser, %	3,00	3,00	3,20	3,20	3,30	3,30
Lysin, %	1,38	1,39	1,32	1,32	1,30	1,26
Lysin, g / MJ ME	0,96	0,97	0,93	0,94	0,95	0,93
Met. + Cys., %	0,85	0,86	0,81	0,82	0,77	0,75
Threonin, %	0,96	0,96	0,90	0,90	0,85	0,82
Calcium, %	0,71	0,72	0,70	0,70	0,76	0,75
Phosphor (mit Phy.), %	0,48	0,49	0,49	0,49	0,52	0,53
verd. Phosphor (mit Phy.), %	0,35	0,35	0,35	0,35	0,38	0,38

Fütterungsmaßnahmen für erfolgreiches Frühabsetzen:

- Frühes Anfüttern ab der ersten Lebenswoche mit hochwertigem Pre-Starter (z. B. Milkiwean 3 K).
- Mehrmals täglich Futter in kleinen Mengen anbieten (flache Futterschalen verwenden).
- Wasserversorgung sicherstellen.
- Die Futterumstellung auf das Ferkelaufzuchtfutter sollte frühestens 12 – 14 Tage nach dem Absetzen erfolgen.
- Ausreichendes Fressplatzangebot beachten.

Mit Milkiwean VarioMix die kritische Absetzphase erfolgreich meistern!