

Milki® Sincropac Konzentrat



Ergänzungsfuttermittel für Rinder

Zusammensetzung: Sonnenblumenöl, Rapsöl

Inhaltsstoffe: 41,0 % Stickstoff; 256,3 % Rohprotein*; 11,4 % Rohfett; 0,0 % Rohfaser; 0,0 % Rohasche; 0,01 % Natrium
*Äquivalent aus Nicht-Protein-Stickstoff

Zusatzstoffe je kg: **Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:** 880 g Harnstoff 3d1 (langsam freisetzend)

Antioxidationsmittel: 23 mg Butylhydroxitoluol (BHT) E 321

Nettomasse: 25 kg

Fütterungshinweis: 50 – 120 g je Tier und Tag. 100 g Milki® Sincropac Konzentrat ersetzen 1 kg Soja - Rapsschrot pro Tier und Tag in einer ausgewogenen Futtermischung. Harnstoff darf nur an Tiere mit entwickeltem Pansen verfüttert werden. Die Dosis von Harnstoff im Futter sollte nach und nach bis zur Höchstdosierung gesteigert werden. Die Höchstdosis sollte nur zusammen mit Futter gegeben werden, das reich an leicht verdaulichen Kohlehydraten und arm an löslichem Stickstoff ist. Höchstens 30 % des Gesamtstickstoffs in der Tagesration sollten aus Harnstoff-N stammen.

Fütterungsempfehlungen:

1. Nicht mehr als 0,3 g Harnstoff/kg Körpergewicht pro Tag.
2. Nicht mehr als 20 % vom Rohprotein in der Ration sollte aus Nicht-Protein-Stickstoff (NPN) stammen.
3. Nicht-Protein-Stickstoff (NPN) sollte nicht mehr als 1 % ausmachen in einer konzentrierten Ration.
4. Fütterung gut durchmischter Rationen. Fressen von großen Mengen in kurzer Zeit vermeiden.

Hinweis: Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische, kühle und trockene Lagerung. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

Zulassungsnummer: BE 1628

Trouw Nutrition Deutschland GmbH 86666 Burgheim Gempfinger Str. 15 xTelefon 0 84 32 / 89-0

pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich