

Insektizideinsatz im Winterraps im Frühjahr

Produkt/ Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Schädlinge						Bienenschutz	Wirkungsweise	Wartezeit in Tagen	max. Zahl der Anwendungen	Bemerkungen
			Großer Rapsstängelrüssler	Gefleckter Kohlrüßler	Rapsglanzkäfer	Kohlschotenmücke	Kohlschotenrüssler	Blattläuse					

Pyrethroide Klasse I

Mavrik Vita/Evure	200 ml	Tau-Fluvalinat 240			X	X	X		B4 ¹⁾	kontakt	56	1	Teil-Wirkung auf Rapsglanzkäfer
Trebon 30 EC	200 ml	Etofenprox 287,5	X	X	X		X		B2	kontakt	F	2	Teil-Wirkung auf Rapsglanzkäfer

Pyrethroide Klasse II

Karate Zeon	75 ml	lambda-Cyhalothrin 100	X	X		X	X		B4 ¹⁾	kontakt	35	2	keine Wirkung auf Rapsglanzkäfer
Troid	150 g	lambda-Cyhalothrin 50	X	X		X	X	X ^(*)	B4 ¹⁾	kontakt	56	1	keine Wirkung auf Rapsglanzkäfer. Erfasst als Kontaktmittel keine verteckt bzw. blattunterseits sitzende Läuse (*).

¹⁾ NB 6623: Bienenungefährlichkeit von B4-Pyrethroiden wie z.B. Karate Zeon wird in Mischung mit bestimmten Azolfungiziden wie z.B. Custodia, Folicur, Orius, Tilmor oder Propulse aufgehoben. Eine Anwendung nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr ist jedoch möglich (B2).

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

Insektizideinsatz in Getreide im Frühjahr

Produkt/Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Schädlinge						Bienenschutz	Wirkungsweise	Wartezeit in Tagen	max. Zahl der Anwendungen	Bemerkungen
			Beißende Insekten	Saugende Insekten	Blattläuse	Blattläuse als Virusvekt.	Getreidehähnchen	Fritfliege					

Pyrethroide Klasse I

Mavrik Vita /Evure	200 ml	Tau-Fluvalinat 240				X	X ¹⁾		B4	kontakt	F	1	Pyrethroid Klasse I; Getreidehähnchen werden miterfasst
--------------------	--------	--------------------	--	--	--	---	-----------------	--	----	---------	---	---	---

Pyrethroide Klasse II

Cyperkill Max	50 ml	Cypermethrin 500				X	X ¹⁾	X	B1	kontakt	42	2	Pyrethroid Klasse II; nicht in Wintergerste und Winterhafer
Karate Zeon	75 ml	lambda-Cyhalothrin 100	X	X	X	X	X	X	B4	kontakt	28	2	Pyrethroid Klasse II; ist durch die Indikation "saugende" und "beißende" mit eingeschlossen
Troid	150 g	lambda-Cyhalothrin 50				X	X	X	B4	kontakt	35	1	Pyrethroid Klasse II

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

¹⁾nur im Herbst