Mais - Herbizidlösungen, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser

Produkt/Lösung	Aufwandmenge /ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatztermin	Unkräuter										Ungräser								Hirsedauerleistung	Bodenwirkung Unkräuter	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke			
TBA-frei																								
MaisTer power	**1,5 l**	**Foramsulfuron 30; Iodosulfuron 1; Thiencarbazone 10**	**BBCH 12 - 16**	●	●	●	◕	◕	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◑	●	◕	◕	◔	◔	**B, B; B**
Arigo + FHS + Peak + IP Pendi 400 SC	300 g + 0,3 l + 12 g + 2,0 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Prosulfuron 750 + Pendimethalin 400	BBCH 12 - 13	●	●	●	●	●	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◑	B; B; F B; K
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	1,25 l + 20 g	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Prosulfuron 750	BBCH 12 - 17	●	●	◕	◕	◕	◔	◕	●	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	B; F B
Nagano[1)] + Nicogan	1,0 l + 1,0 l	Mesotrione 100; Bromoxynil 100 + Nicosulfuron 40	BBCH 12 - 18	◕	●	●	●	●	◔	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	F; C B
Task + FHS + Callisto	300 g + 0,25 l + 1,0 l	Rimsulfuron 33; Dicamba 609 + Mesotrione 100	BBCH 12 - 14	●	●	◕	●	◕	◔	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	B; O F
Nicogan	1,0 l	Nicosulfuron 40	BBCH 12 - 18	◕	◑	◔	◕	○	◔	◔	◑	●	◕	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	○	○	B

[1)] Aufbrauch spätestens 17.09.2021

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern