

Kartoffelherbizide

Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatztermin	Unkräuter										Ungräser			HRAC
				Klettenlabkraut	Windknöterich	Ampferbl. Knöterich	Amarant	Stiefmütterchen	Gänsefußarten	Kamille	Ackerhohlzahn	Franzosenkraut	Nachtschatten	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Flughäfer	

Nachbehandlungen bzw. Ungräser

Citation	1. Termin 0,33 kg 2. Termin 0,2 kg	Metribuzin 700	Nachauflauf	○	◐	◑	◒	◓	◔ ¹⁾	◕	◖	◗	◘	◙ ¹⁾	◚	◛	◜	○	c
Mistral	max. 0,5 kg einmal		Nachauflauf	○	◐	◑	◒	◓	◔ ¹⁾	◕	◖	◗	◘	◙ ¹⁾	◚	◛	◜	○	
Cato + FHS	1. Termin: 30 g + 0,18 l 2. Termin: 20 g + 0,12 l	Rimsulfuron 250	Nachauflauf	◐	○	◑	◒	◓	○	◕	◖	◗	○	◙	◚	◛	◜	◝	B
Cato + FHS + Citation	20 - 30 g + 0,12 - 0,18 l + 200 - 300 g	Rimsulfuron 250 + Metribuzin 700	Nachauflauf	◐	◑	◒	◓	◔ ¹⁾	◕	◖	◗	◘ ¹⁾	○	◙	◚	◛	◜	◝	B + C

¹⁾ Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen ist möglich

Metribuzin-Verträglichkeit der Sorten beachten, v.a. im Nahauflauf

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern