

## Mais - Herbizidlösungen mit guter Bodenwirkung gegen Hirschen

Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz- termin	Unkräuter										Ungräser					Hirse- dauerwirkung	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknoten	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafner	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser

TBA-frei, Sulfonylharnstoff-haltig

Arigo Spectrum Plus-Pack	250 g + 0,25 l + 2,5 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + <b>Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250</b>	BBCH 12-16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	B; B; O + K; K
Spectrum + Task	1,0 l + 300 g + 0,25 l	Dimethenamid-P 720 + Rimsulfuron 33; Dicamba 609	BBCH 10-14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K + B; O
IP Mais Duo 2.0 (Spectrum + IP Elumis)	1,0 l + 1,25 l	Dimethenamid-P 720 + Mesotrione 75; Nicosulfuron 30	BBCH 12-16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K + F; B

TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-frei

Spectrum Gold + Callisto	2,0 l + 0,8 l	Dimethenamid-P 280; Terbutylazin <sup>1)</sup> 250 + Mesotrione 100	BBCH 12-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; C + F
Successor Top 3.0 (Successor T + Border)	3,0 l + 0,75 l	Pethoxamid 300; Terbutylazin <sup>1)</sup> 188 + Mesotrione 100	BBCH 12-14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K; C + F

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - V<sup>1)</sup>) **Terbutylazin:** In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbutylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbutylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.

## Herbizide in Leguminosen/Sonnenblumen

Produkt/Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz- termin	Anwendung in Kultur					Unkräuter					Ungräser					HRAC
				Ackerbohne	Futtererbsen	Lupine	Sojabohne	Samenblume	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Ausfallraps	Amarant	Gänsefuß-Arten	Stiefmütterchen	Knöterich-Arten	Franzosenkraut	Nachtschatten	Jährige Rispe

Spectrum Plus	<b>4,0 l</b>	Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250	<b>Vorauflauf Erbse: NA*</b>	▪	▪	▪	max. 2,5 l	▪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>K; K</b>
Centium 36 CS + Sencor Liquid + Spectrum	<b>0,25 l + 0,3-0,4 l + 0,8 l</b>	Clomazone 360 + Metribuzin 600 + Dimethenamid-P 720	<b>Vorauflauf</b>					▪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>F + C+ K</b>
Gardo Gold	3,0 - 4,0 l	S-Metolachlor 312,5; Terbutylazin 187,5	Vorauflauf			▪			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K + C
Centium 36 CS + Artist	0,25 l + 1,5-2,0 kg	Clomazone 360 + Metribuzin 175; Flufenacet 240	Vorauflauf					▪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	F + C; K

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

\*NA = Nachauflauf