Mais - Herbizidlösungen mit guter Bodenwirkung gegen Hirsen

Produkt/Lösung	Aufwandmenge / ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Unkräuter										Ungräser								Hirsedauerwirkung	Unkrautdauerwirkung	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke			
TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-haltig																								
Task + FHS + Gardo Gold	300 g + 0,25 l + 2,5 l	**Rimsulfuron 33; Dicamba 609 + S-Metolachlor 313; Terbuthylazin[1] 188**	**BBCH 10-14**	●	●	◑	●	◕	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**B; O + K; C**
Arigo + FHS + Gardo Gold	250-300 g + 0,25-0,3 l + 2,5 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + S-Metolachlor 313; Terbuthylazin[1] 188	BBCH 12-18	●	●	●	●	●	◕	◑	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	B; B; O + K; C
Elumis Gold Pack (Gardo Gold + Elumis)	2,5 l + 1,25 l	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Terbuthylazin[1] 188; S-Metolachlor 313	BBCH 12-18	●	●	◕	◕	●	◕	◑	◕	●	●	●	●	◕	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	B; F + C; K
TBA-frei, Sulfonylharnstoff-haltig																								
Spectrum + **Task + FHS**	1,0 l + 300 g + 0,25 l	**Dimethenamid-P 720 + Rimsulfuron 33; Dicamba 609**	**BBCH 10-14**	●	●	◑	●	◕	◕	◑	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◑	◕	◑	**K + B; O**
Arigo Spectrum Plus-Pack + FHS	250 g + 0,25 l + 2,5 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250	BBCH 12-16	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◑	B; B; O + K; K
IP Mais Duo 2.0 (Spectrum + IP Elumis)	1,0 l + 1,25 l	Dimethenamid-P 720 + Mesotrione 75; Nicosulfuron 30	BBCH 12-16	◕	●	◕	●	◕	◕	◑	◑	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◑	K + F; B

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

[1] **Terbuthylazin:** In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.

Mais - Herbizidlösungen, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser

Produkt/Lösung	Aufwandmenge / ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Unkräuter										Ungräser								Hirsedauerleistung	Bodenwirkung Unkräuter	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke			
TBA-frei																								
Task + FHS + Callisto	300 g + 0,25 l + 1,0 l	**Rimsulfuron 33; Dicamba 609 + Mesotrione 100**	**BBCH 12-14**	●	●	◕	●	◕	◔	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	B; O + F
Arigo + FHS + Peak + IP Pendi 400 SC	300 g + 0,3 l + 12 g + 2,0 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Prosulfuron 750 + Pendimethalin 400	BBCH 12-13	●	●	●	●	●	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◑	B; B; F + B; K
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	1,25 l + 20 g	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Prosulfuron 750	BBCH 12-17	●	●	◕	◕	◑	◔	◕	●	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	B; F + B

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern